

Flegamax Forte, 2700 mg/saszetkę, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 6 saszetek

Cena: 37,67 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FLEGAMAX
Opakowanie	6 saszetek
Postać	granulki
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Kaszel
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Flegamax Forte to lek w saszetkach zawierający karbocysteinę o działaniu upłynniającym gęstą, lepka wydzielinę zalegającą w drogach oddechowych - nosie, zatokach, oskrzelach. Przeznaczony jest dla młodzieży powyżej 12 roku życia i dorosłych.

Wskazania

Lek ten stosuje się w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

Działanie

Flegamax Forte zawiera jako substancję czynną karbocysteinę, która upłynnia gęstą, lepka wydzielinę zalegającą w drogach oddechowych. Ułatwia to rzęskom (drobnym włoskom wyścielającym drogi oddechowe) transport wydzieliny oskrzelowej i usuwanie z dróg oddechowych podczas kaszlu.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka raz na dobę (2700 mg karbocysteiny z lizyną).

Skład

- Substancją czynną jest karbocysteina.
- Każda saszetka zawiera 2700 mg karbocysteiny z lizyną (Carbocisteinum lysinum), co odpowiada 1500 mg karbocysteiny.
- Substancje pomocnicze: aspartam (E 951), mannitol, kwas cytrynowy bezwodny, powidon K30, aromat pomarańczowy (maltodekstryna kukurydziana, guma arabska, kwas askorbowy, butylohydroksyanizol (E 320)).

Przeciwwskazania

Stosowanie leku jest przeciwwskazane jeśli pacjent ma uczulenie na karbocysteinę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz u pacjentów z astmą i jeśli występuje czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

Działania niepożądane

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): ból głowy, ból brzucha, biegunka, krwawienia z przewodu pokarmowego, nudności, wymioty, skórne reakcje alergiczne, w tym wysypka rumieniowata, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy oraz wysypka pępekowa, zespół Stevensa-Johnsona.

Ostrzeżenia

- Należy zachować ostrożność jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa oraz w przypadku wystąpienia obfitej ropnej wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc oraz u pacjentów ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Producent

POLPHARMA SA
Pełplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Galeria

