

Flegamina Classic 8 mg tabletki 20 sztuk

Cena: 17,29 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FLEGAMINA
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Przeznaczenie	Kaszel mokry
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Tabletki **Flegamina Fast** o zawartości 8 mg bromoheksyny chlorowodoru są lekiem o działaniu wykrztuśnym i łagodzącym kaszel. Bromoheksyna chlorowodorek pomaga upłynnić gromadzącą się wydzielinę w drogach oddechowych, ułatwiając transport śluzu za pomocą rzęsek i usunięcie go z płuc. Lek jest przeznaczony do stosowania w przypadku ostrej i przewlekłej choroby dróg oddechowych, które wiążą się z trudnościami w odkrztuszaniu i usuwaniu śluzu.

Wskazania

- Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.
- Dla dorosłych oraz dla młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Działanie

Wykrztuśne, łagodzące kaszel.

Dawkowanie

- Dorośli: 1 tabletka 3 razy na dobę. Na początku leczenia może być konieczne zwiększenie dawki do 2 tabletek 3 razy na dobę, co odpowiada 48 mg bromoheksyny (dawka maksymalna).
- Młodzież po 12 roku życia: 1 tabletka 3 razy na dobę. Maksymalnie do 6 tabletek na dobę, co odpowiada 48 mg bromoheksyny.

Skład

1 tabletka zawiera:

- substancję czynną: bromoheksyny chlorowodorek 8 mg,
- pozostałe składniki: mannitol, krospowidon (typ B), sukraloza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, aromat

truskawkowy S-144940 (o składzie: naturalne substancje aromatyzujące, preparaty aromatyzujące), maltodekstryna kukurydziana, skrobia modyfikowana kukurydziana woskowata.

Przeciwwskazania

Lek Flegamina Fast 8 mg nie powinien być stosowany u pacjentów, którzy są uczuleni na bromoheksynę chlorowodorek lub którykolwiek inny składnik preparatu. Ponadto, lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób): ból w górnej części brzucha, nudności, wymioty, biegunka.

Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 osób): wysypka skórna, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości.

Częstość nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): niestrawność, nadmierne pocenie się, ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica), reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd, obniżenie ciśnienia krwi, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, ból głowy, zawroty głowy, senność, skurcz oskrzeli.

Interakcje

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Flegamina Fast w tabletkach z innymi lekami przeciwkaszlowymi, szczególnie zawierającymi kodeinę i jej pochodne, ponieważ mogą one hamować odruch kaszlu i prowadzić do zalegania wydzieliny w drogach oddechowych.

Ostrzeżenia

- u pacjenta występują stany zapalne dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym, lek Flegamina Fast należy zażywać jednocześnie z zaleconymi przez lekarza antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe. Podczas leczenia należy dużo pić, zwłaszcza gdy występuje gorączka.
- Odpowiednie nawodnienie organizmu wspomaga rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.
- u pacjenta stwierdzono w przeszłości chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, jak również z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, ponieważ bromoheksyna może nasilać jej objawy.
- jeśli pacjent ma astmę.
- u pacjenta występuje zaburzona czynność motoryczna oskrzeli np. choroba zwana dyskinezą rzęsek.
- u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub nerek.
- pacjent ma trudności z odkrztuszaniem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

