

Flegamina Classic o smaku miętowym bez cukru 4 mg/5 ml syrop 120 ml



Cena: 17,88 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Drogi oddechowe
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FLEGAMINA
Opakowanie	120 ml (but.)
Postać	Syrop
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Przeznaczenie	Kaszel, Kaszel mokry
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 7 lat

Opis produktu

Opis
Flegamina to syrop stosowany w przypadku kaszlu mokrego (produktywnego). Ułatwia odkrztuszenie zalegającego śluzu.

Wskazania
Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Działanie
Lek Flegamina Fast działa wykrztuśnie i upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych. Poprzez łagodzenie kaszlu, ułatwia odkrztuszenie i oczyszcza oskrzela. Dzięki temu pomaga w usuwaniu nadmiaru śluzu i wydzieliny z dróg oddechowych, co może przynieść ulgę w chorobach dróg oddechowych z zaburzeniami odkrztuszania i gromadzeniem się śluzu.

Dawkowanie

- dzieci w wieku od 7. do 12. lat: 5ml syropu (1 łyżka miarowa) 3 razy na dobę;
- dorośli i dzieci w wieku powyżej 12. lat: 10ml syropu (2 łyżki miarowe) 3 razy na dobę.

Skład
5ml syropu zawiera substancję czynną 4mg bromoheksyny chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: sorbitol ciekły, niekryształujący 70%, glicerol, propylu parahydrokbybenzoesan (E 216), lewomentol, aromat eukaliptusowo- miętowy, etanol 96%, kwas solny stężony, błękit patentowy (E 131), kurkuma (E 100), woda oczyszczona.



Przeciwwskazania

Lek Flegamina Fast ma pewne przeciwwskazania i wymaga ostrożności w niektórych sytuacjach. Należy unikać stosowania leku w przypadku nadwrażliwości na bromoheksynę lub inne składniki leku, jak również w przypadku nietolerancji niektórych cukrów. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 7. roku życia ze względu na zawartość alkoholu w preparacie. W pierwszym trymestrze ciąży i podczas karmienia piersią również należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku. Osoby z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek powinny również stosować lek ostrożnie. Ponadto, należy być ostrożnym podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, ponieważ lek może powodować senność, ból głowy i zawroty głowy.

Działania niepożądane

- reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny,
- ból głowy zawroty głowy, senność,
- skurcz oskrzeli,
- obrzęk naczynioruchowy,
- pokrzywka, świąd,
- nadmierne pocenie się,

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.