

Flegtac Kaszel 1,6 mg/ ml, syrop, 200 ml



Cena: 17,09 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	200 ml (but.)
Postać	Syrop
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Lek Flegtac Kaszel 200 ml to przezroczysty, bezbarwny syrop o działaniu wykrztuśnym, odpowiedni dla dzieci powyżej 2. roku życia oraz dorosłych. Zawiera bromoheksyny chlorowodorek (Bromhexini hydrochloridum) jako substancję czynną, która działa wykrztuśnie, rozrzedza wydzielinę w drogach oddechowych i ułatwia jej transport. Efekt działania syropu Flegtac Kaszel to łatwiejsze odkrztuszanie i złagodzenie kaszlu.

Wskazania

Syrop Flegtac Kaszel: lek stosuje się u osób dorosłych i dzieci powyżej 2. roku życia:

- w ostrych i przewlekłych schorzeniach dróg oddechowych przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania oraz usuwania śluzu.

Działanie

Lek wykazuje działanie wykrztuśne i upłynniające wydzielinę w drogach oddechowych.

Dawkowanie

- Dorośli (w tym w podeszłym wieku): 5 ml syropu, 3 razy na dobę. Na początku leczenia konieczne może być zwiększenie dawki do 10 ml syropu, 3 razy na dobę.
- Dzieci powyżej 12. roku życia: 5 ml syropu, 3 razy na dobę.
- Dzieci od 6. do 12. roku życia: 2,5 ml syropu, 3 razy na dobę.
- Dzieci od 2. do 6. roku życia: 1,25 ml syropu, 3 razy na dobę.

Skład

1 ml syropu Flegtac Kaszel zawiera:

- substancję czynną: bromoheksyny chlorowodorek 1,6 mg,
- substancje pomocnicze: sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E420) w ilości 760 mg/ml, glikol propylenowy w ilości 40 mg/ml,

metylu parahydroksybenzoesan (E218) w ilości 0,90 mg/ml, propylu parahydroksybenzoesan (E216) w ilości 0,10 mg/ml, sacharyna sodowa (E954), woda oczyszczona, aromat wiśniowy (glikol propylenowy, alkohol benzylový, trietylu cytrynian, kwas mlekowy, 4-metoksyacetofenon, 3-hydroksy-2-metylo-4-piron (maltol), aldehyd anyżowy, kwas benzoesowy).

Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na bromoheksynę lub inne składniki leku.
- Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.
- Wrodzona nietolerancja fruktozy.
- Nie podawać dzieciom poniżej 2. roku życia.

Działania niepożądane

Rzadko:

- nudności, bóle brzucha (w szczególności ból w nadbrzuszu), wymioty, biegunka,
- wysypka, pokrzywka,
- reakcje nadwrażliwości.

Bardzo rzadko:

- ból głowy, zawroty głowy,
- senność.

Częstość nieznana :

- niestrawność,
- nadmierne pocenie się,
- ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica),
- reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny),
- obrzęk naczynioruchowy i świąd,
- obniżenie ciśnienia krwi,
- zwiększona aktywność enzymów wątrobowych AST i ALT.

Ostrzeżenia

- Znane są przypadki ciężkich reakcji skórnych powiązanych ze stosowaniem bromoheksyny, będącej substancją czynną leku. W przypadku wystąpienia wysypki (w tym pęcherzy i zmian na błonach śluzowych, np. jamy ustnej, gardła, nosa, oczu lub narządów płciowych), należy natychmiast przerwać stosowanie syropu Flegtac Kaszel i pilnie udać się do lekarza.
- Jeśli po upływie tygodnia od rozpoczęcia stosowania leku nie ma poprawy lub pacjent czuje się gorzej, należy udać się do lekarza.
- W sytuacji pominięcia dawki leku, należy zażyć ją niezwłocznie, chyba że zbliża się pora przyjęcia następnej dawki. Wówczas nie należy uzupełniać dawki, a raczej kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami od następnej dawki. Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.
- Flegtac Kaszel lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216), i może powodować reakcje alergiczne (również typu późnego).
- 1 ml syropu zawiera 760 mg sorbitolu (E420) o wartości kalorycznej 2,6 kcal/g sorbitolu. Sorbitol jest źródłem fruktozy. W przypadku nietolerancji niektórych cukrów lub dziedzicznej nietolerancji fruktozy nie należy stosować leku. Sorbitol może powodować dyskomfort w układzie pokarmowym i działać łagodnie przeczyszczająco.
- Lek zawiera glikol propylenowy (40 mg / 1 ml).
- W przypadku pytań związanych z lekiem Flegtac Kaszel lub jego stosowaniem należy zwrócić się do farmaceuty lub lekarza.

Producent

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Bankowa 4
44-100 Gliwice