

Fluimucil Forte 600 mg, 10 tabletek musujących

Cena: 13,40 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka musująca
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Fluimucil Forte to lek przeciwkaszlowy w postaci tabletek musujących stosowany krótkoterminowo. Jego głównym składnikiem jest acetylocysteina, która pomaga rozrzedzić wydzielinę z dróg oddechowych, ułatwiając jej odkrztuszenie.

Wskazania

Fluimucil Forte stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszenie u pacjentów z objawami zakażenia związanego z przeziębieniem.

Dawkowanie

Ze względu na ilość substancji czynnej leku Fluimucil Forte stosuje się tylko u osób dorosłych.

- Zalecana dawka to 1 tabletka musująca produktu Fluimucil Forte (600 mg) raz na dobę.
- Tabletkę w połowie szklanki letniej wody, a roztwór należy wypić bezpośrednio po przygotowaniu.
- W trakcie leczenia należy przyjmować zwiększoną ilość płynów
- Nie należy stosować leku Fluimucil Forte dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Skład

Substancją czynną leku jest acetylocysteina (Acetylcysteinum).

1 tabletka musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny.

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan (zawiera sól), aspartam, aromat cytrynowy (zawiera glukozę).

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Stan astmatyczny.
- Fenyloketonuria.

Działania niepożądane

- Niezbyt często występujące działania niepożądane: nadwrażliwość, ból głowy, szum w uszach, tachykardia (przyspieszenie czynności serca), wymioty, biegunka, zapalenie jamy ustnej, ból brzucha, nudności, pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry i błon śluzowych, który najczęściej dotyczy: twarzy, gardła, krtani, narządów płciowych, jelit), świąd, gorączka, obniżenie ciśnienia krwi.
- Rzadko występujące działania niepożądane: skurcz oskrzeli, duszność, niestrawność.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane: ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna, reakcja rzekomoanafilaktyczna), krwotok.
- Częstość nieznana: obrzęk twarzy.

Ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z astmą oskrzelową oraz u których występuje lub występowała w przeszłości choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, zwłaszcza jeśli jednocześnie stosuje on inne leki o znanym działaniu drażniącym błonę śluzową żołądka. Należy zachować ostrożność również, jeśli lek jest stosowany długotrwale u pacjentów z nietolerancją histaminy, gdyż mogą u nich wystąpić takie objawy, jak ból głowy, katar naczynioruchowy, świąd skóry. W przypadku upłynięcia dużych ilości wydzieliny należy ją odsysać, szczególnie u unieruchomionych pacjentów a także małych dzieci. W przypadku osób ze zmniejszoną zdolnością odkrztuszania nie należy podawać acetylocysteiny, jeśli nie zapewni się pacjentowi w czasie leczenia fizykoterapii oddechowej.

Producent

ZAMBON