

Fluimucil Muko, 200 mg, granulat w saszetkach, 20 saszetek



Cena: 21,09 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Drogi oddechowe
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 saszetek
Postać	granulki
Producent	ZAMBON SPA
Przeznaczenie	Kaszel, Kaszel mokry
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 7 lat

Opis produktu

Opis

Jest to produkt leczniczy dostępny bez recepty (OTC) w postaci granulatu, który służy do sporządzania roztworu doustnego. Lek ten jest odpowiedni do krótkotrwałego stosowania u pacjentów z objawami zakażenia w górnych drogach oddechowych. Główną substancją czynną w tym leku jest acetylocysteina, która działa na rozrzedzenie śluzowo-ropnej wydzieliny oraz śluzu.

Wskazania

Do krótkotrwałego stosowania u pacjentów z objawami infekcji w obrębie górnych dróg oddechowych w celu ich oczyszczenia, poprzez rozrzedzenie wydzieliny dróg oddechowych i ułatwienie jej odkrztuszania.

Działanie

Mukolityczne (upłynnia wydzielinę dróg oddechowych i ułatwia jej odkrztuszanie).

Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 7 do 14 lat: 1 saszетка 2 razy na dobę.
- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 14 lat: 1 saszетка 2 do 3 razy na dobę.

Skład

1 saszетка (1 g granulatu) zawiera:

- substancję czynną: acetylocysteina (Acetylcysteinum) 200 mg;
- substancje pomocnicze: aspartam, beta-karoten (zawiera sacharozę i mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu), aromat pomarańczowy (zawiera glukozę i laktozę), sorbitol.

Przeciwwskazania



Należy pamiętać, że istnieją pewne przeciwwskazania i ograniczenia dotyczące stosowania tego leku. Nie należy go stosować w przypadku nadwrażliwości na dowolną substancję wchodzącą w skład leku, stanu astmatycznego oraz fenyloketonurii. Ważne jest również zauważyć, że ze względu na ilość substancji czynnej, lek Fluimucil Muko 200 mg nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 7. roku życia.

Dodatkowo, należy unikać stosowania leku u dzieci poniżej 2. roku życia, ponieważ acetylocysteina może powodować niedrożność dróg oddechowych u dzieci w tej grupie wiekowej.

Działania niepożądane

- Ból głowy,
- Szum w uszach,
- Tachykardia,
- Wymioty, biegunka, ból brzucha, nudności,
- Pokrzywka, wysypka,
- Gorączka,
- Obniżenie ciśnienia tętniczego,

Interakcje

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Fluimucil Muko jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, ponieważ może dojść do zalegania wydzieliny w wyniku zmniejszenia odruchu kaszlowego.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera aspartam - źródło fenyloalaniny.
- Lek zawiera sacharozę.
- Lek zawiera glukozę i laktozę - nie stosować u pacjentów z nietolerancją niektórych cukrów.
- Lek zawiera sorbitol, który jest źródłem fruktozy.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

ZAMBON