

Fluimucil Muko Junior, 100 mg / 1 g, granulat, 20 saszetek

Cena: 12,08 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 saszetek po 1 g
Postać	Saszetki
Producent	ZAMBON SPA
Przeznaczenie	Mukolityczne, Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Fluimucil Muko Junior to środek leczniczy przeznaczony do tymczasowego stosowania, który wspomaga usuwanie zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych, ułatwiając jej odkrztuszenie przy infekcjach górnych dróg oddechowych. Zawiera substancję aktywną – acetylocysteinę – i może być stosowany zarówno u dzieci powyżej 3. roku życia, jak i u dorosłych.

Wskazania

Fluimucil Muko Junior stosuje się jako lek ułatwiający odkrztuszenie u pacjentów z objawami infekcji w obrębie górnych dróg oddechowych.

Działanie

Fluimucil Muko Junior wykazuje działanie mukolityczne. Acetylocysteina zawarta w produkcie, powoduje rozrywanie wiązań dwusiarczkowych polipeptydów śluzu znajdującego się w drogach oddechowych. Dzięki temu upłynnia śluz oraz wydzielinę śluzowo-ropną.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 3 do 6 lat – 1 saszetka 2-3 x na dobę.
- Dzieci w wieku od 7 do 14 lat – 2 saszetki 2 x na dobę lub 1 saszetka 4 x na dobę.
- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 14 lat: 2 saszetki 2-3 x na dobę.

Skład

- Substancją czynną leku jest acetylocysteina.
- Jedna saszetka (1 g) roztworu zawiera 100 mg acetylocysteiny.
- Substancje pomocnicze: aspartam, β -karoten (zawiera sacharozę i mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu), aromat pomarańczowy (zawiera glukozę i laktozę), sorbitol.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników Fluimucil Muko Junior,
- jeśli u pacjenta występuje stan astmatyczny lub fenyloketonuria,
- u dzieci poniżej 3 lat.

Działania niepożądane

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

- nadwrażliwość, ból głowy, szum w uszach,
- tachykardia (przyspieszenie czynności serca),
- wymioty, biegunka, zapalenie jamy ustnej, ból brzucha, nudności,
- pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, świąd,
- gorączka,
- obniżenie ciśnienia krwi.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

- skurcz oskrzeli, duszność,
- niestrawność.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna, reakcja rzekomoanafilaktyczna),
- krwotok.

Działania niepożądane występujące z częstością nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- obrzęk twarzy.

Producent

ZAMBON