

Fluimucil tabletki musujące 600 mg 10 tabletek

Cena: 13,87 zł



Opis słownikowy

Część ciała	Drogi oddechowe
Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka musująca
Producent	ZAMBON SPA
Przeznaczenie	Kaszel, Kaszel mokry, Przeziębienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu

Opis

Fluimucil Forte to lek w postaci musujących tabletek, przeznaczony dla osób dorosłych. Jego główną substancją czynną jest Fluimucil, która ma właściwości rozrzedzające wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiającej jej odkrztuszenie. Lek ten jest stosowany krótkotrwale u pacjentów z objawami zakażenia związanego z przeziębieniem.

Fluimucil Forte działa poprzez rozrywanie wiązań dwusiarczkowych w polipeptydach śluzu w drogach oddechowych, co pomaga upłynnić śluz i wydzielinę śluzowo-ropną. Działanie to ułatwia odkrztuszenie i usuwanie zalegającej wydzieliny, co przyczynia się do oczyszczenia dróg oddechowych.

Wskazania

Lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszenie u pacjentów z objawami zakażenia związanego z przeziębieniem

Działanie

Upłynnia śluz i wydzielinę śluzowo-ropną, poprzez rozrywanie wiązań dwusiarczkowych w polipeptydach śluzu w drogach oddechowych.

Dawkowanie

Fluimucil Forte stosuje się doustnie, zaraz po rozpuszczeniu tabletki musującej w połowie szklanki letniej wody. Zaleca się, aby podczas leczenia pacjent przyjmował zwiększoną ilość płynów. Leku nie należy stosować dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem. Ważne, aby ostatnią dawkę leku Fluimucil Forte przyjąć minimum 4 godziny przed snem.

Zwykle stosowane u osób dorosłych to 1 tabletki musująca (600 mg) leku Fluimucil Forte raz na dobę.

Skład

1 tabletki musująca zawiera:

- substancję czynną: 600 mg acetylocysteiny
- kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, aspartam, aromat cytrynowy.

Lek zawiera aspartam i sól.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku u pacjentów uczulonych na acetylocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników. Przeciwwskazaniem do zastosowania tabletek musujących Fluimucil Forte jest stan astmatyczny oraz fenyloketonuria.

Działania niepożądane

- ból głowy,
- gorączka,
- nadwrażliwość,
- skurcz oskrzeli,
- duszność,

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Węgiel aktywny może osłabiać działanie leku Fluimucil Forte.

Ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z astmą oskrzelową oraz u których występuje lub występowała w przeszłości choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, zwłaszcza jeśli jednocześnie stosuje on inne leki o znanym działaniu drażniącym błonę śluzową żołądka. Należy zachować ostrożność również, jeśli lek jest stosowany długotrwale u pacjentów z nietolerancją histaminy, gdyż mogą u nich wystąpić takie objawy, jak ból głowy, katar naczyń i ruchowy, świąd skóry.

W przypadku upłynięcia dużych ilości wydzieliny należy ją odsysać, szczególnie u unieruchomionych pacjentów a także małych dzieci. W przypadku osób ze zmniejszoną zdolnością odkrztuszania nie należy podawać acetylocysteiny, jeśli nie zapewni się pacjentowi w czasie leczenia fizykoterapii oddechowej.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.