APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Fluormex zel 50 g

Cena: 21,72 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	50 g
Postać	Żel
Producent	CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY

Opis produktu

Opis
Fluormex żel jest produktem leczniczym stosowanym do kontaktowej fluoryzacji zębów. Jego składniki czynne to aminofluorki i fluorek sodu, które mają właściwości przeciwdziałające próchnicy. Produkt jest przeznaczony do stosowania zarówno u dorosłych, jak i u dzieci powyżej 5. roku życia.

Wskazania
Kontaktowa fluoryzacja zębów jest stosowana w wielu przypadkach w celu zapobiegania próchnicy i poprawy zdrowia zębów. Oto niektóre zastosowania kontaktowej fluoryzacji:

-Profilaktyka próchnicy

- Niedorozwój twardych tkanek zębów
- Nadwrażliwość szyjek zębowych
- Odwapnienie szkliwa
- Ochrona przed uszkodzeniami związanymi z aparatami ortodontycznymi

Kontaktowa fluoryzacja może być stosowana zarówno u dzieci powyżej 5. roku życia, jak i u dorosłych

Działanie
Przeciwpróchnicze, remineralizujące szkliwo.

Skład
1 g żelu zawiera: 33,19 mg aminofluorków (Aminofluoridum), 22,1 mg sodu fluorku (Natrii fluoridum). Pozostałe składniki to: glicerol, propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, hydroksyetyloceluloza, glikol poliksyetylenopolioksypropylenowy, woda oczyszczona, substancja poprawiająca smak i zapach (aromat miętowy).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancje czynne lub substancje pomocnicze: Jeżeli osoba jest uczulona na substancje zawarte w produkcie do fluoryzacji, należy unikać stosowania go.
Dzieci w wieku do 5 lat: Kontaktowa fluoryzacja nie jest zalecana u dzieci poniżej 5. roku życia, ponieważ mogą one niezdolne do

odpowiedniego płukania i połykania produktu, co może prowadzić do nadmiernego spożycia fluorków.
Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami o wysokim stężeniu fluorków: Stosowanie kilku produktów fluoryzujących o wysokim stężeniu fluorków jednocześnie może prowadzić do nadmiernego spożycia fluorków, co jest niekorzystne dla zdrowia zębów.
Rejony o wysokiej zawartości fluoru w wodzie pitnej: W przypadku, gdy woda pitna zawiera już wystarczającą ilość fluorków (powyżej 0,7 mg/l), nie zaleca się dodatkowej fluoryzacji zębów, aby uniknąć nadmiernego spożycia fluorków.
Częste i nadmierne stosowanie: Nie zaleca się częstego stosowania kontaktowej fluoryzacji zębów, częściej niż raz na dwa tygodnie i nie więcej niż 10 razy w roku. Nadmierne stosowanie fluorków może prowadzić do zjawiska fluorozy, czyli nadmiernego nagromadzenia fluorków w organizmie.
Osoby bez próchnicy lub o małym ryzyku próchnicy: Kontaktowa fluoryzacja zębów jest zwykle zalecana dla osób o podwyższonym ryzyku próchnicy. Osoby bez obecności próchnicy lub o małym ryzyku niekoniecznie potrzebują regularnej fluoryzacji.

Uwagi
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.