

Forlax 10 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 10 saszetek

Cena: 23,45 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FORLAX
Opakowanie	10 saszetek
Postać	Proszek
Producent	IPSEN CONSUMER HEALTHCARE
Przeznaczenie	Przeczyszczające, Wspomaganie pracy jelit
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 8 lat

Opis produktu

Opis

Forlax 10 g to lek w postaci proszku o właściwościach przeczyszczających. Jest stosowany jako pomocnicze i tymczasowe leczenie zaparć u dorosłych i dzieci powyżej 8. roku życia.

Wskazania

Objawowe leczenie zaparć u dorosłych.

Działanie

Przeczyszczające.

Dawkowanie

U dzieci powyżej 8 lat i dorosłych: rekomendowana dawka to jedna-dwie saszetki na dobę, przyjmowane najlepiej w postaci jednej dawki rano. Dawka dobową zależy od uzyskanego efektu i wynosi od jednej saszetki co drugi dzień (szczególnie u dzieci) do maksymalnie dwóch saszetek na dobę. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody (co najmniej 50ml) bezpośrednio przed spożyciem.

Skład

1 saszetka zawiera: makrogolu 4000 - 10g. Ponadto lek zawiera: sacharynę sodową (E954), aromat pomarańczowo-grejpłutowy), skoncentrowany sok pomarańczowy, cytral, aldehyd octowy, linalol, etylu, maślan, alfa-terpineol, oktanal, beta-gamma-heksenol, maltodekstryna, guma arabska, sorbitol, butylowany hydroksyanizol (E320) oraz dwutlenek siarki (E220).

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Forlax 10 g:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na makrogol (glikol polietylenowy) lub którykolwiek z pozostałych składników
- jeśli u pacjenta występuje choroba taka jak ciężka choroba jelit
- choroba zapalna jelit (taka, jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, Choroba LeśniowskiegoCrohna),
- perforacja przewodu pokarmowego lub ryzyko wystąpienia perforacji przewodu pokarmowego,
- niedrożność jelit lub podejrzenie niedrożności jelit,
- ból brzucha o nieustalonej przyczynie.

Działania niepożądane

U dzieci:

Często:

- Ból brzucha
- Biegunka, która może także powodować bolesność wokół odbytu

Niezbyt często:

- Nudności lub wymioty
- Wzdęcia

Częstość nieznana:

- Reakcje alergiczne (nadwrażliwość)

U dorosłych:

Często:

- Ból brzucha i wzdęcia
- Nudności
- Biegunka

Niezbyt często:

- Wymioty
- Nagła potrzeba udania się do toalety
- Nietrzymanie stolca

Bardzo rzadko:

- Objawy reakcji alergicznej takie jak wysypka, pokrzywka, obrzęk, obrzęk twarzy (w postaci obrzęku Quinckego) z obrzękiem górnej i (lub) dolnej wargi i (lub) policzków

Częstość nieznana:

- Niedobór sodu we krwi, niedobór potasu we krwi, możliwość odwodnienia spowodowana ciężką biegunką, szczególnie u osób w podeszłym wieku.

Ostrzeżenia

- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- U dzieci leczenie nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące.
- Lek powinien stanowić jedynie tymczasowe leczenie pomocnicze dodatkowo do leczenia zaparcia odpowiednim trybem życia i dietą. Jeżeli pomimo zastosowania diety objawy utrzymują się, należy wykryć przyczynę i wdrożyć odpowiednie leczenie.
- W przypadku stwierdzenia nietolerancji niektórych cukrów (sorbitol) przed przyjęciem tego leku należy skonsultować się z lekarzem.
- Z powodu zawartości dwutlenku siarki lek może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Producent

IPSEN PHARMA
Al. Jana Pawła II 29
Warszawa