

Fortimel Max o smaku waniliowym, 4x300ml

Cena: 55,64 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	4 butelki po 300 ml
Postać	Płyn
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Odżywcze
Rodzaj produktu	Żywność
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Fortimel Max to płynny produkt o smaku waniliowym, przeznaczony jako środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia. Jest zalecany w dietach odżywczych w przypadku niedożywienia związanego z chorobą, zwłaszcza w przypadku mukowiscydozy. Fortimel Max to wysokokaloryczny produkt (2,4 kcal/ml), który jednak nie zawiera glutenu.

Dawkowanie

1 butelka podzielona na 3 porcje rozłożone w ciągu dnia.

Skład

Woda, syrop glukozowy, białka mleka krowiego, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), mleczan potasu, emulgator (lecytyna sojowa), wodorofosforan magnezu, aromat, chlorek cholicy, cytrynian potasu, cytrynian sodu, L-askorbinian sodu, chlorek sodu, mleczan żelaza(II), chlorek potasu, nikotynamid, siarczan cynku, barwnik (kurkumina), octan DL-alfa-tokoferolu, octan retinolu, glukonian miedzi(II), selenian(IV) sodu, siarczan manganu, D-pantotenian wapnia, chlorek chromu(III), D-biotyna, cholekalcyferol, chlorowodorek tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, chlorowodorek pirydoksyny, molibdenian(IV) sodu, ryboflawina, fluorek sodu, jodek potasu, fitomenadion, cyjanokobalamina.

Przeznaczenie

Fortimel Max, płyn jest przeznaczony do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą, refundowany we wskazaniu mukowiscydozy.

Uwagi

- Stosować pod nadzorem lekarza.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Produkt nieodpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
- Stosować ostrożnie u dzieci w wieku 6–10 lat.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Nie stosować u pacjentów z galaktozemią.
- Monitorować podaż płynów, aby zapewnić odpowiedni stan nawodnienia pacjenta.
- Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w lodówce, w zamkniętej butelce, nie dłużej niż 24 godziny.

Producent

NUTRICIA .
Bobrowiecka 8
Warszawa