

Foxill, 1 mg/g, żel, 50 g

Cena: 45,44 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 tubka po 50 g
Postać	Żel
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Chłodzące, Przeciwalergiczne, Przeciwozbrętkowe, Przeciwswiądowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Foxill to lek łagodzący zmiany skórne, zmniejszający świąd i obrzęk. Stosowany przy ukąszeniach, oparzeniach pierwszego stopnia oraz pokrzywce.

Wskazania

Foxill stosuje się do łagodzenia świądu towarzyszącego: chorobom skóry, pokrzywce, ukąszeniom owadów, oparzeniom słonecznym, powierzchownym oparzeniom skóry (pierwszego stopnia).

Działanie

Foxill działa miejscowo przeciwuczuleniowo, silnie przeciwswiądowo (z wyłączeniem świądu cholestatycznego), zmniejsza obrzęki, łagodzi podrażnienia skóry. Wykazuje miejscowe właściwości znieczulające. Chłodzi, co dodatkowo łagodzi podrażnioną skórę. Żel szybko wchłania się w głąb skóry.

Dawkowanie

Zazwyczaj Foxill stosuje się 2 do 4 razy na dobę. Cienką warstwę żelu należy nanieść na zmienioną chorobowo skórę.

Skład

- Substancją czynną leku jest dimetyndenu maleinian (Dimetinden maleas).
- 1 g żelu zawiera 1 mg dimetyndenu maleinianu (Dimetinden maleas).
- Substancje pomocnicze: karbomer (typ 974 P), disodu edetynian, sodu wodorotlenek, glikol propylenowy, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Foxill, jeśli pacjent ma uczulenie na dimetyndenu maleinian lub którykolwiek składnik tego leku. oraz w

przypadku oparzeń drugiego i trzeciego stopnia.

Działania niepożądane

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): uczucie pieczenia skóry, suchość skóry, skórne reakcje alergiczne obejmujące wysypkę i swędzenie skóry.

Ostrzeżenia

- Foxill zawiera benzalkoniowy chlorek, który jest drażniący i może powodować reakcje skórne oraz glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.
- Należy unikać ekspozycji na słońce miejsc posmarowanych żelem Foxill.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Producent

POLPHARMA S.A.
Peplińska 19
Starogard Gdański

Galeria

