

Furaginum Hasco, 50 mg, tabletki, 30 tabletek

Cena: 17,12 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 15 lat

Opis produktu

Opis

Furaginum Hasco w tabletkach to lek przeciwdziałający rozprzestrzenianiu się, ujawniającym drogi moczowe. Zawiera furaginę i jest zarówno w ostrych, jak i nawracających, niepowiązanych z występowaniem dolnych dróg moczowych. Są przeznaczone dla dorosłych oraz młodzieży powyżej 15. roku życia.

Wskazania

Furaginum Hasco stosuje się w terapii nawracających niepowikłanych, a także ostrych zakażeń dolnych dróg moczowych.

Działanie

Furaginum Hasco zawiera furazydynę, hamującą rozwój bakterii powodujących zakażenia dolnych dróg moczowych.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat:

- Pierwszy dzień leczenia: 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg (2 tabletki) 3 razy na dobę. Lek należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie wchłaniania furazydyny. Kreska dzieląca ułatwia przełamanie tabletki w celu jej łatwiejszego połknięcia i nie służy do podziału tabletki na dwie równe dawki.
- Lek stosuje się przez 7-10 dni. Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po 7-10 dniach, należy zwrócić się do lekarza. W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach

Skład

Substancją czynną leku jest furazydyna (Furazidinum), inaczej nazywana furaginą.

Substancje pomocnicze: skrobia żelowana, kukurydziana; sacharoza; krzemionka koloidalna bezwodna; kwas stearynowy 50.

Przeciwwskazania

Nie stosować u osób z nadwrażliwością na furazydynę, pochodne nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest okres donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko wystąpienia u noworodka niedokrwistości hemolitycznej (anemii związanej z rozpadem krwinek czerwonych). Leku nie podawać osobom ze stwierdzoną niewydolnością nerek czy polineuropatią.

Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 pacjentów): nudności, nadmierne oddawanie gazów; bóle głowy.
- Działania niepożądane występujące nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów: sinica, niedokrwistość megaloblastyczna (niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego) lub niedokrwistość hemolityczna; zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia; reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego; reakcje ostre - objawiają się gorączką, dreszczami, kaszlem, bólami w klatce piersiowej, dusznością, wysiękiem do przestrzeni w klatce piersiowej; zaparcia, biegunka, objawy dyspeptyczne (np. uczucie pełności poposiłkowej, wzdęcia), bóle brzucha, wymioty, zapalenie ślinianek, zapalenie trzustki, rzekomobłoniaste zapalenie jelit; łysienie, złuszczone zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy); gorączka, dreszcze, złe samopoczucie, zakażenia drobnoustrojami opornymi na furaginę; świąd, pokrzywka, reakcje anafilaktyczne (nagłe reakcje alergiczne miejscowe lub ogólnoustrojowe), obrzęk naczynioruchowy (choroba skóry i tkanki podskórnej polegająca na powstawaniu ograniczonych obrzęków), wysypka; objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna (wywołana przeszkodą w odpływie żółci), martwica miększy wątroby.

Ostrzeżenia

- Przy długotrwałym stosowaniu leku (6 miesięcy), należy wykonać badanie krwi (w celu kontroli liczby białych krwinek) oraz czynności nerek i wątroby.
- Zastosowanie leku skonsultować z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występują: zaburzenia czynności nerek, wątroby, zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witamin z grupy B, kwasu foliowego, gorączka, dreszcze, kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszność.
- Lek zawiera sacharozę, 14 mg w 1 tabletkę, więc w przypadku pacjentów z nietolerancją niektórych cukrów przed zastosowaniem produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem.
- Bardziej szczegółowa lista ostrzeżeń dostępna jest w ulotce dołączonej do opakowania.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław