

Galvenox Veno 500 mg, 30 kapsułek



Cena: 24,51 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	GALVENOX
Opakowanie	30 kapsułki
Postać	Kapsułki
Producent	FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "GALENA"
Przeznaczenie	Hemoroidy, Obrzęk, Skurcze, Żylaki
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Galvenox Veno to lek w postaci kapsułek twardej. Zawiera substancję czynną – wapnia dobezytan jednowodny, który działa na ściany naczyń włosowatych.

Kapsułki Galvenox Veno są wskazane w objawowym leczeniu przewlekłej niewydolności żylną. Do typowych objawów zaliczane są żylaki, obrzęki, ból, kurcze i uczucie ciężkości nóg oraz zmiany skórne na tle zastój krwi. Produkt leczniczy może być także stosowany w leczeniu objawowym żylaków odbytu, czyli hemoroidów.

Wskazania

- Leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylną kończyn dolnych: żylaki, obrzęki, ból, drętwienie, mrowienie, kurcze i uczucie ciężkości nóg, zmiany skórne na tle zastój krwi.
- Objawowe leczenie żylaków odbytu.

Działanie

Uszczelniające naczynia krwionośne, przeciwapagacyjne.

Dawkowanie

Zazwyczaj przyjmuje się od 1 do 2 kapsułek na dobę. Okres leczenia wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Skład

1 kapsułka zawiera:

- substancja czynna: wapnia dobezytan jednowodny 500 mg,
- substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E171), azorubina (E122), żółcień

chinolinowa (E104), żelatyna.

Przeciwwskazania

Galvenox Veno nie powinny przyjmować osoby, które mają nadwrażliwość na dobezylan wapnia lub substancje pomocnicze leku.

Działania niepożądane

- ból w nadbrzuszu,
- nudności,
- biegunki,
- wymioty,
- reakcje skórne,
- bóle stawów,
- bóle i zawroty głowy,
- gorączka.

Ostrzeżenia

- Stosować ostrożnie, jeżeli występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, lub przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka.
- U osób z ciężką niewydolnością nerek, zwłaszcza dializowanych, należy stosować zmniejszone dawki leku.
- Należy okresowo kontrolować czynności żołądka i dwunastnicy. W przypadku zaostrzenia objawów lek należy odstawić i skonsultować się z lekarzem.
- Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła lub krtani, ból podczas przełykania, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okolic narządów płciowych i odbytu, ponieważ mogą to być objawy ciężkiej choroby: agranulocytozy.
- Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.
- Lek Galvenox Veno może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie wtedy, gdy potencjalna korzyść ze stosowania leku przewyższa możliwe ryzyko dla płodu.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.