

Gardan, 500 mg, tabletki, 10 tabletek

Cena: 14,67 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwwgorączkowe, Rozkurczające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Gardan to środek leczniczy o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, stosowany w przypadkach nasilonych dolegliwości bólowych.

Wskazania

- Lek Gardan stosuje się w bólu różnego pochodzenia o dużym nasileniu oraz w gorączce.
- Lek Gardan stosuje się gdy inne leki przeciwbólowe były nieskuteczne lub są przeciwwskazane.
- Gardan wskazany jest do krótkotrwałego stosowania u osób dorosłych.

Działanie

Substancja czynna leku Gardan (metamizol sodowy) działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo oraz lekko rozkurczająco.

Dawkowanie

250 mg - 500 mg od 2 do 3 razy na dobę. Tabletkę można podzielić na połowę.

Skład

- Substancją czynną leku jest metamizol sodowy (Metamizolum natricum).
- 1 tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego.
- Substancje pomocnicze: skrobia pszeniczna, celuloza mikrokryształiczna (typ 101), powidon K25, talk, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Gardan jeśli pacjent: ma uczulenie na metamizol sodowy lub inne pochodne pirazonu, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; ma astmę wywołaną lub zaostrzoną przez niesteroidowe leki przeciwzapalne; ma reakcje nadwrażliwości na jakikolwiek niesteroidowy lek przeciwzapalny lub lek przeciwbólowy, w szczególności objawiające się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa; ma ostrą porfirię wątrobową; ma wrodzony niedobór enzymu dehydrogenazy

glukozy-6-fosforanowej; ma ciężką niewydolność wątroby lub nerek; ma choroby hematologiczne (krwi), w tym niedokrwistość aplastyczną, agranulocytozę i leukopenię.

Działania niepożądane

- Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 1000): polekowa wysypka skórna.
- Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10 000): reakcje nadwrażliwości, jak reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny (zagrożająca życiu gwałtowna reakcja alergiczna); Objawami nadwrażliwości może być świąd, pokrzywka, obrzęk ogólny lub miejscowy, zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego (niekiedy poprzedzonym jego wzrostem), trudności w oddychaniu; leukopenia (zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych).
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000): pęcherzyki na skórze i wewnątrz jamy ustnej lub złuszczenie się skóry, mogące wskazywać na ciężką reakcję skórą; agranulocytoza (znaczne, zagrożające życiu zmniejszenie liczby białych krwinek – granulocytów), objawiająca się: gorączką, dreszczami, bólem gardła, trudnościami w połykaniu oraz stanami zapalnymi błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytu; małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi); niedokrwistość hemolityczna (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może spowodować błądliwość lub żółtaczka skóry, osłabienie lub duszność); niedokrwistość aplastyczna (znaczne zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek, co może być przyczyną krwawienia, siniaków, wybroczyn lub zakażeń); zaburzenia czynności nerek (białkomocz, skąpomocz, wielomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek).

Ostrzeżenia

- Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia: objawów agranulocytozy, jak na przykład gorączka, ból gardła lub krtani, ból podczas przełykania, zapalenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okolic narządów płciowych i odbytu; objawów ciężkiej reakcji uczuleniowej, jak na przykład duszności, obrzęk języka lub gardła powodujący zaburzenia połykania, obrzęk naczynioruchowy, wysypka czy pokrzywka, świąd, zaburzenia rytmu serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.
- Należy zachować szczególną ostrożność: w przypadku uczulenia na leki przeciwbólowe lub leki przeciwreumatyczne, inne produkty lub żywność; u pacjentów z astmą oskrzelową (duszność, ataki duszności), zwłaszcza jeśli towarzyszy jej polipowate zapalenie błony śluzowej nosa i zatok, oraz z chorobami alergicznymi; u pacjentów z chorobami objawiającymi się zmniejszeniem liczby krwinek białych; u pacjentów z niedociśnieniem, odwodnionych lub z niewydolnością serca; u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby; w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Producent

Sopharma AD
Iliensko Shosse 16
1220 Sofia, Bułgaria