


Gardimax medica, 5 mg + 1 mg, tabletki do ssania, 24 tabletki



Cena: 32,30 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	GARDIMAX
Opakowanie	24 tabletki
Postać	Tabletki do ssania
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne, Przeciwbólowe, Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Gardimax Medica to miętowe tabletki do ssania dostępne bez recepty, stosowane w celu doraźnego łagodzenia bólu wynikającego ze stanów zapalnych lub podrażnień w jamie ustnej i gardle. Produkt jest odpowiedni dla dzieci od 6. roku życia oraz dorosłych. Gardimax Medica zawiera chlorowoderek lidokainy, zapewniający miejscowe działanie znieczulające, dichlorowoderek chlorheksydyny o właściwościach przeciwbakteryjnych, a także lewomentol.

Wskazania

Lek stosuje się przy podrażnieniach czy stanach zapalnych gardła oraz jamy ustnej.

Działanie

Gardimax medica dzięki zawartości chlorheksydyny działa przeciwbakteryjnie, a dodatek lidokainy powoduje, że lek wykazuje także właściwości miejscowo znieczulające.

Dawkowanie

- Dorośli: ssać powoli 6 do 10 tabletek na dobę;
- Dzieci powyżej 6 lat: połowa dawki dla dorosłych, czyli 3 do 5 tabletek do ssania na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: dichlorowoderek chlorheksydyny oraz chlorowoderek lidokainy.
- Jedna tabletki do ssania zawiera 5 mg dichlorowodorku chlorheksydyny i 1 mg chlorowodorku lidokainy.
- Substancje pomocnicze: sorbitol (E420), magnezu stearynian, kwas cytrynowy bezwodny, lewomentol.



Przeciwwskazania

Leku należy nie stosować: u dzieci poniżej 6 lat; jeżeli pacjent ma uczulenie na substancje czynne leku lub którykolwiek z pozostałych jego składników; z uwagi na obecność mentolu, należy zachować ostrożność podczas stosowania u dzieci.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, GARDIMAX MEDICA może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią: reakcja alergiczna skóry i błony śluzowej (wysypki, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, złuszczenie się błony śluzowej, obrzęk ślinianek), możliwość pojawienia się zaburzenia smaku, uczucie pieczenia na języku i ostrych reakcji alergicznych (reakcje anafilaktyczne), po długotrwałym i stałym stosowaniu chloroheksydyny mogą pojawić się przejściowo brązowe przebarwienia na zębach. Przebarwienia te można usunąć.

Ostrzeżenia

- Lek ten zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki (powyżej 20 tabletek do ssania w ciągu doby) może nastąpić zbyt duża utrata wrażliwości w okolicach głośni, powodując spadek kontroli nad odruchem połykania a w następstwie zwiększa ryzyko zachłyśnięcia.
- Lek Gardimax medica zawiera sorbitol: Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

TACTICA
ul. Królowej Jadwigi 148A/1A,
30-212 Kraków