


Gardimax medica lemon, 5 mg+1 mg, tabletki do ssania bez cukru, 24 tabletki



Cena: 32,99 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	24 tabletki
Postać	Tabletki do ssania
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne, Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

GARDIMAX MEDICA LEMON, tabletki do ssania o smaku cytrynowym to lek dostępny bez recepty do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Przeznaczony jest dla dzieci od 6. roku życia i osób dorosłych. GARDIMAX MEDICA LEMON zawiera substancje czynne lidokainy chlorowodorek o działaniu miejscowo znieczulającym oraz chlorheksydyny dichlorowodorek o działaniu przeciwbakteryjnym.

Wskazania

GARDIMAX MEDICA LEMON stosuje się objawowo w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Działanie

Lek GARDIMAX MEDICA LEMON wykazuje działanie miejscowo znieczulające (lidokaina) oraz przeciwbakteryjne (chlorheksydyna).

Dawkowanie

- Dorośli: 6 do 10 tabletek do ssania na dobę, tabletkę należy ssać powoli,
- Dzieci w wieku od 6 lat: połowa tabletki dla dorosłych (3 do 5 tabletek na dobę).

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: chlorheksydyny dichlorowodorek oraz lidokainy chlorowodorek.
- 1 tabletko do ssania zawiera 5 mg chlorheksydyny dichlorowodoru oraz 1 mg lidokainy chlorowodoru.
- Substancja pomocnicze: sorbitol (E 420), magnezu stearynian, aspartam (E 951), aromat cytrynowy 501050 AP0551, acesulfam potasowy (E 950)



Przeciwwskazania

Lek GARDIMAX MEDICA LEMON nie powinien być stosowany: jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (dichlorowodorek chlorheksydyny lub chlorowodorek lidokainy) lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub którykolwiek z pozostałych składników leku, dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, GARDIMAX MEDICA LEMON może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią: reakcja alergiczna skóry i błony śluzowej (wysypki, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, złuszczenie się błony śluzowej, obrzęk ślinianek); możliwość pojawienia się zaburzenia smaku, uczucie pieczenia na języku i ostrych reakcji alergicznych (reakcje anafilaktyczne); po długotrwałym i stałym stosowaniu chlorheksydyny mogą pojawić się przejściowo brązowe przebarwienia na zębach. Przebarwienia te można usunąć

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku GARDIMAX MEDICA LEMON należy zwrócić się do farmaceuty.
- Leku GARDIMAX MEDICA LEMON nie należy stosować długotrwale.
- Nie należy ssać jednej tabletki bezpośrednio po drugiej i stosować produkt u osób szczególnie skłonnych do alergii.
- Zaleca się zapewnić co najmniej 30-minutową przerwę pomiędzy stosowaniem pasty do zębów, a zastosowaniem leku, ze względu na zawartość w pastach anionowych związków powierzchniowo czynnych (laurylosiarczan sodu), które mogą reagować z chlorheksydyną.
- W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki (powyżej 20 tabletek na dobę) istnieje ryzyko wystąpienia zbyt dużej utraty wrażliwości w obszarze głośni, powodującej zmniejszenie kontroli odruchu połknięcia i zwiększenie ryzyka zachłyśnięcia.
- Lek Gardimax zawiera sorbitol i aspartam - sorbitol może mieć łagodne działanie przeczyszczające; aspartam jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25oC.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Producent

TACTICA
ul. Królowej Jadwigi 148A/1A,
30-212 Kraków