


Gardimax medica lemon spray, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 30 ml



Cena: 36,29 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 butelka po 30 ml
Postać	Aerozol
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Przeznaczenie	odkażające, Przeciwbakteryjne, Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 30 miesiąca życia

Opis produktu

Opis

Gardimax medica lemon spray, aerozol do stosowania w jamie ustnej o smaku cytrynowym to lek dostępny bez recepty do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Przeznaczony jest dla dzieci od 30. miesiąca życia (2,5 lat) i osób dorosłych. Gardimax medica lemon spray zawiera lidokainę chlorowodorek o działaniu miejscowo znieczulającym i roztwór diglukonianu chlorheksydyny o działaniu przeciwbakteryjnym.

Wskazania

Wskazania do stosowania leku Gardimax medica lemon spray: leczenie objawowe dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Działanie

Gardimax medica lemon spray zawiera 2 substancje czynne: chlorheksydynę, która wykazuje działanie przeciwbakteryjne (bakteriostatycznie i bakteriobójczo) i lidokainę - środek miejscowo znieczulający. Lek łagodzi dolegliwości bólowe.

Dawkowanie

- Dzieci powyżej 2,5 roku (30 miesięcy): 2-3 dawki jednorazowo, 3-5 razy na dobę.
- Młodzież w wieku od 12 lat i dorośli: 3-5 dawek jednorazowo, 6-10 razy na dobę

Skład

- Substancjami czynnymi są: roztwór diglukonianu chlorheksydyny (Chlorhexidini digluconatis solutio) i chlorowodorek lidokainy

(Lidocaini hydrochloridum).

- 1 dawka aerozolu zawiera 0,180 mg roztworu diglukonianu chlorheksydyny oraz 0,045 mg chlorowodorku lidokainy.
- Substancje pomocnicze: aromat cytrynowy CRA1585L (o składzie: etanol, cytral, terpineol, geraniol, linalol, cytronellol, syntetyczne substancje aromatyzujące, butylohydroksyanizol (E 320), butylohydroksytoluen (E 321), woda), sukraloza (E 955), glicerol (E 422), glikol propylenowy (E 1520), kwas cytrynowy jednowodny, etanol 96%, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Gardimax medica lemon spray w przypadku: nadwrażliwości na substancje czynne - chlorowodorek lidokainy, diglukonianu chlorheksydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; u dzieci poniżej 30 miesięcy (2,5 roku).

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Gardimax medica lemon spray może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią: reakcja alergiczna skóry i błony śluzowej (wysypki, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, złuszczenie się błony śluzowej, obrzęk ślinianek); możliwość pojawienia się zaburzenia smaku, uczucie pieczenia na języku i ostrych reakcji alergicznych (reakcje anafilaktyczne); po długotrwałym i stałym stosowaniu chloroheksydyny mogą pojawić się przejściowo brązowe przebarwienia na zębach. Przebarwienia te można usunąć.

Gardimax medica lemon spray zawiera butylohydroksyanizol (BHA) (E 320) i butylohydroksytoluen (BHT) (E 321). Mogą one powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie błon śluzowych.

W razie wystąpienia ciężkiej reakcji uczuleniowej, której objawami mogą być omdlenia, osłabienie, trudności w połykaniu, oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła, języka lub innej części ciała, świąd czy wysypka, należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast zwrócić się do lekarza lub skontaktować się z oddziałem ratunkowym.

Ostrzeżenia

- Leku Gardimax medica lemon spray nie należy stosować długotrwale.
- Nie należy stosować jednej dawki po drugiej.
- Należy ograniczyć stosowanie tego leku do przypadków, kiedy złagodzenie występującego bólu i podrażnienia jest absolutnie konieczne.
- Należy unikać kontaktu z oczami i uszami. Jeżeli aerozol dostanie się do oczu, należy niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody.
- Należy unikać stosowania leku u osób szczególnie skłonnych do alergii.
- W przypadku stosowania leku i pojawienia się nowych objawów jak gorączka, należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek zawiera alkohol. Może być szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu.
- Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować symptomy alkoholopodobne.
- Po pierwszym użyciu produkt leczniczy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Producent

TACTICA
ul. Królowej Jadwigi 148A/1A,
30-212 Kraków

Galeria

