

Gastrotuss, syrop przeciwrefluksowy, 20 ml x 20 saszetek

Cena: 58,65 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	GASTROTUSS
Opakowanie	20 saszetek po 20 ml
Postać	Syrop
Producent	VITAMED PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące)
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Syrop Gastrotuss, dostępny w postaci saszetek, jest produktem medycznym, który tworzy barierę antyrefluksową. Zalecany jest w terapii refluksu żołądkowo-przełykowego i refluksu krtaniowo-gardłowego, łagodząc przy tym objawy takie jak: zarzucanie treści pokarmowej, zgaga, uczucie przeszkody w gardle, zapalenie nosowej i krtaniowej gardła, odbijanie, wzdęcia, kaszel, dysfonia oraz w celu łagodzenia innych zaburzeń spowodowanych refluksowym podrażnieniem. Produkt jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Składniki

Alginian magnezu, symetykon, fruktoza, guma ksantanowa, miód, D-pantenol, płynne ekstrakty z *Althaea officinalis* (prawoślaz lekarski) i *Papaver Rhoeas* (mak polny), tlenek cynku, wodorowęglan sodu, wodorotlenek sodu, metylu p-hydroksybenzoesan sodowy, propylu p-hydroksybenzoesan sodowy, aromaty naturalne, erytrozyna (E127), woda oczyszczona.

Zastosowanie

Leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego i refluksu krtaniowo-gardłowego oraz objawów takich jak:

- zarzucanie treści pokarmowej,
- zgaga (pieczenie przełyku),
- uczucie przeszkody w gardle,
- zapalenie części nosowej i krtaniowej gardła,
- odbijanie,
- wzdęcia,
- kaszel,
- dysfonia (chrypka z refluksowego podrażnienia głośni),
- inne zaburzenia związane z reflukssem.

Sposób użycia



Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia:

- jeśli lekarz nie zaleci inaczej, jedna saszetka (20 ml) po głównych posiłkach i przed snem,
- do stosowania doustnego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Ostrzeżenia

- W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.
- Nie przekraczać zalecanych dawek, przestrzegać zalecanego sposobu stosowania.
- Jeśli pacjent przyjmuje inne preparaty lub leki, syrop należy stosować jako ostatni.
- Przed zastosowaniem należy upewnić się, czy opakowanie nie jest uszkodzone.
- Preparatu nie należy używać po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.
- Termin ważności odnosi się do nieuszkodzonego i prawidłowo przechowywanego produktu.

Ważne wskazówki

Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem syropu.

Producent

D.M.G Italia s.r.l.
Via Laurentina Km. 26, 700
Pomezia, Włochy