

# Gaviscon Tabletki do rozgryzania i żucia o smaku mięty 24 sztuki

Cena: 20,00 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	GAVISCON
Opakowanie	24 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Przeznaczenie	Nadkwaśność, Refluks, Zgaga
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

## Opis produktu

### Opis

**Gaviscon** o smaku mięty Tab to lek w postaci praktycznych tabletek do rozgryzania i żucia o smaku miętowym. Jest stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak nadmierne odbijanie, zgaga i niestrawność, które często pojawiają się po posiłkach lub w okresie ciąży. Lek jest także przydatny dla pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku. Gaviscon Tab zawiera składniki takie jak alginian, wodorowęglan sodu i węglan wapnia. Te składniki tworzą ochronną warstwę, która utrzymuje się na powierzchni treści żołądkowej. Dzięki temu zapobiegają one cofaniu się kwasowej treści żołądkowej z żołądka, co redukuje uczucie bólu i dyskomfortu w gardle oraz jamie ustnej, znane jako zgaga.

### Wskazania

Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność.

### Działanie

Lek Gaviscon o smaku mięty tworzy ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni treści żołądkowej. Warstwa ta zapobiega cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej z żołądka, co powoduje zmniejszenie bólu i uczucia dyskomfortu w gardle i jamie ustnej.

### Dawkowanie

Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: 2-4 tabletki po posiłkach i przed snem w przypadku wystąpienia objawów.

### Skład

1 tabletki zawiera:

- substancje czynne leku: alginian sodu 250 mg, wodorowęglan sodu 133,5 mg, węglan wapnia 80 mg,
- substancje pomocnicze: mannitol (E421), makrogol 20000, kopowidon, aspartam (E951), aromat mięty pieprzowej, magnezu



stearynian oraz acesulfam potasowy.

#### **Przeciwwskazania**

Kiedy nie przyjmować leku Gaviscon o smaku mięty TAB:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek składnik leku.

#### **Działania niepożądane**

Reakcje alergiczne na składniki leku (takie jak wysypki skórne, świąd, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła).

#### **Ostrzeżenia**

Lek zawiera sód (5,3 mmol na dawkę składającą się z dwóch tabletek) i wapno (1,6 mmol na dawkę składającą się z dwóch tabletek).