

Ginkofar 40 mg, 60 tabletek

Cena: 30,06 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	GINKOFAR
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	BIOFARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Koncentracja, Pamięć
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Ginkofar to lek stosowany w celu poprawy funkcji poznawczych, zwłaszcza w przypadku osób starszych, które doświadczają osłabienia pamięci i sprawności umysłowej.

Wskazania

Lek Ginkofar stosuje się w celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych. W celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji.

Działanie

Zmniejsza niedokrwienie mózgu, usprawnia przepływ mózgowy oraz obwodowy w kończynach dolnych, chroni komórki przed niedotlenieniem, hamuje agregację płytek krwi i zwiększa płynności krwi.

Dawkowanie

3 razy na dobę po 2 tabletki.

Skład

1 tabletki powlekana zawiera: substancję czynną: Ginkgo bilboae folium extractum siccum (35-67:1), ekstrahent-aceton 60% (v/v), wyciąg suchy z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgobiloba L., folium) 40mg, w tym: wyciąg natywny: 90-100%, o składzie: 22-27% ginkgoflawonoglikozydów, 5-7% laktonów terpenowych (w tym 2,8-3,4% ginkgolidów A,B iC oraz 2,6-3,2% bilobalidu), nie więcej niż 5ppm kwasów ginkgolowych, substancja pomocnicza: glukoza ciekła 0-10%, pozostałe składniki: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kaspowidon, magnez stearynian, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, tlenek żelaza żółty (E172), talk.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ginkofar:

- jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z miłorzębu lub którykolwiek ze składników leku,



- jeśli pacjentka jest w ciąży.

Działania niepożądane

- ból głowy,
- zawroty głowy,
- dolegliwości żołądkowo-jelitowe,

Ostrzeżenia

- Osoby ze skłonnością do krwawień, powinny się skontaktować z lekarzem przed zastosowaniem leku.
- Osoby stosujące leki wpływające na krzepliwość krwi, powinny się skontaktować z lekarzem przed zastosowaniem leku.
- Przed zabiegiem operacyjnym lub stomatologicznym należy poinformować lekarza o stosowaniu leku. Zaleca się odstawienie leku 3-4 dni przed planowanym zabiegiem.
- Lek stosować ostrożnie u osób z padaczką.
- Lek zawiera laktozę.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.