

Ginkofar Extra 240 mg, 60 tabletek

Cena: 79,61 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	GINKOFAR
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	BIOFARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Koncentracja, Pamięć
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Ginkofar Extra to lek stosowany w celu poprawy zdolności poznawczych, zwłaszcza w przypadku osób starszych, które doświadczają osłabienia pamięci i sprawności umysłowej.

Wskazania

W celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem); w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji. Produkt jest wskazany do stosowania u osób dorosłych.

Działanie

Kwasyfikowany wyciąg z liści miłorzębu japońskiego poprawia przepływ krwi w mózgu, rozszerza naczynia krwionośne i zapobiega agregacji płytek.

Dawkowanie

Dawkowanie dla osób dorosłych: 1 tabletkę na dobę,

Skład

1 tabletkę zawiera 240mg kwasyfikowanego suchego wyciągu z liści miłorzębu (*Ginkgo biloba* L., folium) (35-67:1), co odpowiada: 52,8 do 64,8mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe, 6,72 do 8,16mg ginkgolidów A,B i C, 6,24 do 7,68mg bilobalidu. Rozpuszczalnik używany do pierwszej ekstrakcji: aceton 65% v/v. Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, kroscarmelozę sodową, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3000, tlenekżelaza żółty (E172), talk.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ginkofar extra:

- jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z miłorzębu lub którykolwiek ze składników leku,



- jeśli pacjentka jest w ciąży.

Działania niepożądane

- ból głowy,
- zawroty głowy,
- dolegliwości żołądkowo-jelitowe,

Ostrzeżenia

- Osoby ze skłonnością do krwawień, powinny się skontaktować z lekarzem przed zastosowaniem leku.
- Osoby stosujące leki wpływające na krzepliwość krwi, powinny się skontaktować z lekarzem przed zastosowaniem leku.
- Przed zabiegiem operacyjnym lub stomatologicznym należy poinformować lekarza o stosowaniu leku. Zaleca się odstawienie leku 3-4 dni przed planowanym zabiegiem.
- Lek stosować ostrożnie u osób z padaczką.
- Lek zawiera laktozę.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.