

Ginkofar Extra, 240 mg, tabletki powlekane, 30 tabletek

Cena: 51,84 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	BIOFARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomagające, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Ginkofar Extra to lek stosowany w celu wspierania zdolności poznawczych, takich jak pamięć i sprawność umysłowa, u osób starszych.

Wskazania

Ginkofar extra stosowany jest u osób dorosłych: w celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem); w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji.

Działanie

Ginkofar extra poprawia przepływ krwi w mózgu. Dodatkowo rozszerza naczynia krwionośne i zapobiega agregacji płytek krwi. Działanie to przypisuje się zawartym w wyciągu z miłorzębu związkom: glikozydy flawonowe, ginkgolidy, bilbalid.

Dawkowanie

Dawkowanie dla osób dorosłych: 1 tabletkę na dobę,

Skład

- Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z liścia miłorzębu (*Ginkgo biloba* L., folium) (35-67:1).
- 1 tabletkę powlekana zawiera 240 mg suchego wyciągu o zawartości substancji czynnych:

52,8 do 64,8 mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe,
6,72 do 8,16 mg ginkgolidów A, B i C,
6,24 do 7,68 mg bilbalidu,

- Substancje pomocnicze:



Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, kroscarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3000, tlenek żelaza żółty (E 172), talk.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Ginkofar extra, jeśli pacjent/pacjentka: ma uczulenie na wyciąg z miłorzębu lub którykolwiek ze składników leku; jest w ciąży.

Działania niepożądane

- Bardzo często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 osoby na 10): ból głowy.
- Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób na 100): zawroty głowy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe (biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty).
- Częstość nieznana: krwawienia z poszczególnych narządów (ocz, nosa, układ pokarmowy, naczynia mózgowe), reakcje uczuleniowe (rumień, obrzęk, wstrząs).

Ostrzeżenia

- Osoby ze skłonnością do krwawień, powinny się skontaktować z lekarzem przed zastosowaniem leku.
- Osoby stosujące leki wpływające na krzepliwość krwi, powinny się skontaktować z lekarzem przed zastosowaniem leku.
- Przed zabiegiem operacyjnym lub stomatologicznym należy poinformować lekarza o stosowaniu leku. Zaleca się odstawienie leku 3-4 dni przed planowanym zabiegiem.
- Lek stosować ostrożnie u osób z padaczką.
- Lek zawiera laktozę.

Producent

BIOFARM
Wałbrzyska 13
Poznań