

Ginkofar forte 80 mg, 60 tabletek



Cena: 39,10 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	GINKOFAR
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	BIOFARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Koncentracja, Pamięć
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Ginkofar Forte to lek w postaci tabletek, który zawiera wyciąg z liści miłorzębu japońskiego (*Ginkgo biloba* L.) jako substancję czynną. Składniki aktywne wyciągu to glikozydy flawonowe, ginkgolidy oraz bilobalid. Każda tabletkę tego leku zawiera 80 mg tych substancji aktywnych. Ginkofar Forte jest stosowany w różnych celach, w tym w poprawie zdolności poznawczych, zwłaszcza w przypadku osób starszych, które doświadczają osłabienia pamięci i sprawności umysłowej.

Wskazania

Ginkofar Forte jest wskazany do stosowania w celu:

- poprawy zdolności poznawczych osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związanej z wiekiem),
- poprawy komfortu życia w łagodnej demencji.

Działanie

Poprawa przepływu krwi w mózgu, rozszerzanie naczyń krwionośnych i zapobieganie agregacji płytek.

Dawkowanie

Dawkowanie dla osób dorosłych: 3 razy na dobę po 1 tabletkę.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: *Ginkgo bilobae folium extractum siccum* (35-67:1), ekstrahent-aceton 60% (v/v), wyciąg suchy z liści miłorzębu japońskiego (*Ginkgo biloba* L., folium) 80 mg, w tym natywny: 90-100% o składzie: 22-27% ginkgoflawonoglikozydów, 5-7% laktonów terpenowych, w tym: 2,8-3,4% ginkgolidów A, B i C oraz 2,6-3,2% bilobalidu, nie więcej niż 5 ppm kwasów ginkgolowych,
- substancja pomocnicza: glukoza ciekła 0-10%,



- pozostałe składniki: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, powidon, krospowidon, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, talk, tlenek żelaza żółty (E 172).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ginkofar forte:

- jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z miłorzębu lub którykolwiek ze składników leku,
- jeśli pacjentka jest w ciąży.

Działania niepożądane

- ból głowy,
- zawroty głowy,
- dolegliwości żołądkowo-jelitowe,

Ostrzeżenia

- Osoby ze skłonnością do krwawień, powinny się skontaktować z lekarzem przed zastosowaniem leku.
- Osoby stosujące leki wpływające na krzepliwość krwi, powinny się skontaktować z lekarzem przed zastosowaniem leku.
- Przed zabiegiem operacyjnym lub stomatologicznym należy poinformować lekarza o stosowaniu leku. Zaleca się odstawienie leku 3-4 dni przed planowanym zabiegiem.
- Lek stosować ostrożnie u osób z padaczką.
- Lek zawiera laktozę.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań