

Ginkofar Intense 120 mg, 30 tabletek



Cena: 32,80 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	GINKOFAR
Opakowanie	30 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	BIOFARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomagające, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Ginkofar Intense to lek stosowany w celu poprawy zdolności poznawczych, zwłaszcza w przypadku osób starszych, które doświadczają osłabienia pamięci i sprawności umysłowej.

Wskazania

W celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem); w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji. Produkt jest wskazany do stosowania u osób dorosłych.

Działanie

Kwasyfikowany wyciąg z liści miłorzębu japońskiego poprawia przepływ krwi w mózgu, rozszerza naczynia krwionośne i zapobiega agregacji płytek.

Dawkowanie

Dawkowanie dla osób dorosłych: 2 tabletki na dobę (1 rano i 1 wieczorem),

Skład

1 tabletki zawiera: kwasyfikowany suchy wyciąg z liści miłorzębu 120mg (*Ginkgo biloba* L., folium) (35-67:1), co odpowiada 26,4 do 32,4mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe, 3,36 do 4,08mg ginkgolidów A,B i C, 3,12 do 3,84mg bilobalidu. Rozpuszczalnik używany do pierwszej ekstrakcji: aceton 65% (v/v). Pozostałe składniki: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3000, tlenek żelaza żółty (E172), talk.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ginkofar intense:

- jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z miłorzębu lub którykolwiek ze składników leku,



- jeśli pacjentka jest w ciąży.

Działania niepożądane

- Ból głowy,
- Zawroty głowy,
- Dolegliwości żołądkowo-jelitowe,

Ostrzeżenia

- Osoby ze skłonnością do krwawień, powinny się skontaktować z lekarzem przed zastosowaniem leku.
- Osoby stosujące leki wpływające na krzepliwość krwi, powinny się skontaktować z lekarzem przed zastosowaniem leku.
- Przed zabiegiem operacyjnym lub stomatologicznym należy poinformować lekarza o stosowaniu leku. Zaleca się odstawienie leku 3-4 dni przed planowanym zabiegiem.
- Lek stosować ostrożnie u osób z padaczką.
- Lek zawiera laktozę.

Ciąża i karmienie piersią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

BIOFARM
Wałbrzyska 13
Poznań