

Glimbax, 0,74 mg / ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła, 200 ml



Cena: 40,90 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	GLIMBAX
Opakowanie	200 ml
Postać	Roztwór
Producent	ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis
Glimbax to lek zawierający diklofenak, który wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe i przeciwbólowe.

Wskazania
Lek Glimbax stosuje się w:

- leczeniu objawowym stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła (np. objawów zapalenia dziąseł, zapalenia jamy ustnej, zapalenia gardła, w stanach po zabiegach stomatologicznych, objawów podrażnienia mechanicznego).

Działanie
Glimbax zawiera jako substancję czynną diklofenak, który jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ). Podczas stosowania miejscowego w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła diklofenak wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Dawkowanie
Lek Glimbax należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty lub informacją zawartą w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zaleca się stosowanie roztworu do płukania jamy ustnej i gardła od 2 do 3 razy na dobę. Każdorazowo należy użyć 15 ml roztworu (1 miarkę) nierozcieńczonego lub rozcieńczonego niewielką ilością wody i płukać jamę ustną przez około 30-60 sekund. Po użyciu roztwór należy wypłuć.

Skład

- Substancją czynną leku jest diklofenak.



- 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku (w postaci kwasu).
- Substancje pomocnicze: cholina roztwór 50%, sorbitol, sodu benzoesan, sodu edetynian, acesulfam potasowy, naturalny aromat brzoskwinowy, naturalny aromat miętowy, czerwień koszenilowa (E124), woda oczyszczona

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Glimbax:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (diklofenak) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Glimbax,
- jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub na inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. po

podaniu ibuprofenu, ketoprofenu, aspiryny wystąpił napad astmy, pokrzywka lub katar alergiczny),

- u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Działania niepożądane

Podczas stosowania leku (zwłaszcza długotrwałego) mogą wystąpić objawy podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej (np. pieczenie) i kaszel. Może również dojść do rozwoju reakcji nadwrażliwości.

Ostrzeżenia

- Lek Glimbax zawiera sodu benzoesan, który powoduje podrażnienie błon śluzowych.
- Lek Glimbax zawiera czerwień koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne.

Producent

ANGELINI PHARMA POLSKA SP.Z O.O.
Aleje Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa

Galeria

