

# Glukoza cytrynowa prosz. 75 g

Cena: 5,62 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	75 g
Postać	prosz.do sporz.roztw.doust.
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.

## Opis produktu

### Opis

Diather Glucose to proszek o smaku cytrynowym do sporządzania roztworu doustnego stosowany w teście doustnej tolerancji glukozy (OGTT). Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego stosuje się również w dietetycznym leczeniu niedoboru węglowodanów, zmęczenia np. po długotrwałym wysiłku fizycznym, hipoglikemii u chorych na cukrzycę, w tym np.

Glukoza to cukier dostarczający energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Po przyjęciu doustnym glukoza jest łatwo wchłaniana z przewodu pokarmowego, metabolizowana w tkankach i częściowo magazynowana w wątrobie w postaci glikogenu.

Każda torebka Diather Lemon Glucose zawiera 75g czystego cukru cytrynowego. Produkt przeznaczony dla osób w każdym wieku.

### Zastosowanie

Glukoza do doustnego testu tolerancji glukozy (krzywa przedcukrowa).

W zakresie diety:

- przy niedoborze węglowodanów,
- przy przemęczeniu, m.in.

### Sposób użycia

Jak wykorzystuje się glukozę w teście tolerancji glukozy?

Test OGTT wykonuje się u osób z podejrzeniem cukrzycy typu 2.

Badanie rozpoczyna się od pobrania krwi żyłnej w celu oznaczenia glukozy na czczo, następnie wypij 75 g glukozy rozpuszczonej w 200-300 ml wody w ciągu 3-5 minut i ponownie po 60 (test trzypunktowy) i 120 minutach (test dwupunktowy) test). test). test punktowy) pobiera się próbkę krwi żyłnej w celu określenia poziomu cukru we krwi.

W spoczynku osoba badana powinna zachować dwugodzinny okres między wypiciem roztworu glukozy a pobraniem krwi

Jak stosować glukozę w warunkach niedoboru węglowodanów?

Gdy pojawią się objawy hipoglikemii, należy przyjąć 10-20 g glukozy, co po około 10-20 minutach prowadzi do wzrostu cukru we krwi.

Aby zapobiec nawrotom hipoglikemii, należy spożywać węglowodany złożone i powtórzyć pomiar stężenia glukozy we krwi w ciągu 60 minut.

U pacjentów intensywnie leczonych insuliną, analogami insuliny lub podczas leczenia osobistą pompą insulinową w przypadku wystąpienia hipoglikemii należy przyjąć 15 g glukozy doustnie i zmierzyć glikemię po 15 minutach.

Jeśli poziom glukozy we krwi jest nadal niski, powtórz test glukozy i zmierz poziom glukozy we krwi po kolejnych 15 minutach (reguła 15/15).

Uwaga: ¼ woreczka zawiera ok. 17 g glukozy.

#### Ważne wskazówki

- Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.
- Preparat Glukoza 75 g o smaku cytrynowym Diather nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Produkt nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.
- Nie stosować u osób, u których nie stwierdzono wymienionych stanów chorobowych, zaburzeń stanu zdrowia lub brak jest wskazań lekarskich do jego stosowania.
- Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zalecanego spożycia i sposobu użycia zamieszczonymi na opakowaniu.
- Lekarz może zalecić okres przyjmowania oraz porcję preparatu indywidualnie dopasowane do potrzeb dietetycznych.
- Przechowywać w temperaturze do 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Chronić przed światłem i wilgocią.