

Glukoza, proszek do przygotowania roztworu doustnego, 75 g

Cena: 4,41 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	75 g (saszetka)
Postać	Proszek
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Rodzaj produktu	Żywność
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Glukoza w postaci proszku do przygotowania roztworu doustnego to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia, używany do przeprowadzania doustnego testu obciążenia glukozą, krzywej cukrowej oraz testu OGTT (Oral Glucose Tolerance Test). Może być również stosowany w przypadkach niedoboru węglowodanów, wyczerpania oraz hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą. Produkt jest odpowiedni dla osób w każdym wieku.

Skład

1 saszetka zawiera 75 g glukozy

Składniki

Sposób użycia

Test obciążenia glukozą wykonuje się u osób, u których podejrzewa się cukrzycę typu 2. Podczas przygotowania do testu należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Na badanie należy udać się na czczo (minimum po 8 godzinach od ostatniego posiłku). Po oznaczeniu stężenia glukozy na czczo należy wypić w ciągu 3-5 minut 75 g glukozy rozpuszczonej w 200-300 ml wody. Po upływie 60 (test trzypunktowy) i 120 minut (test dwupunktowy) ponownie pobiera się próbkę krwi żyłnej celem oznaczenia glikemii. Dwugodzinny okres pomiędzy wypiciem roztworu glukozy, a pobraniem krwi osoba badana powinna spędzić w spoczynku.

Produkt może być również stosowany w stanach niedoboru węglowodanów, w stanach wyczerpania oraz hipoglikemii u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą. W przypadku wystąpienia objawów hipoglikemii należy przyjąć 10-20 g glukozy. Spowoduje to wzrost glikemii po około 10 – 20 minutach. W celu uniknięcia ponownego incydentu hipoglikemii należy spożyć węglowodany złożone, a pomiar glikemii powtórzyć po 60 minutach. U chorych leczonych metodą intensywnej insulinoterapii, z zastosowaniem analogów insuliny lub podczas leczenia za pomocą osobistej pompy insulinowej, w przypadku hipoglikemii należy przyjąć 15 g glukozy doustnie i skontrolować glikemię po 15 minutach. Jeśli nadal utrzymuje się niska wartość glikemii, należy powtórzyć badanie glukozy i skontrolować stężenie glukozy we



APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

krwi po kolejnych 15 minutach (reguła 15/15).

Ostrzeżenia

- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Nie może być stosowany jako jedyne źródło żywienia.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Producent

DIATHER

ul.Twarda 1/14

00-114 Warszawa