


# Gripex Hot Lek przeciw objawom przeziębienia i grypy 8 sztuk



Cena: 24,96 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	GRIPEX
Opakowanie	8 saszetek
Postać	Proszek
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Gorączka, Grypa, Katar
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

## Opis produktu

### Opis

**Gripex Hot** to kompleksowy lek w postaci proszku, który po rozpuszczeniu w wodzie służy do łagodzenia reakcji z przeziębieniem, grypą i objawami do ich choroby. Jego aktywny składnik to paracetamol, fenylefryna i witamina C.

Lek ten działa przeciwgorączkowo, zmniejszając gorączkę, przeciwbólowo, łagodząc ból głowy, nerek, mięśni i stawów oraz udrożniając na nos, co pomaga w zmniejszeniu zatkanego nosa i ułatwia oddychanie. Ponadto Gripex Hot wspomaga łagodzenie różnych działań związanych z przeziębieniem, w tym bólu mięśniowego, kostno-stawowego oraz zapalenia błony śluzowej nosa. Preparat jest dostępny w formie saszetek i może być stosowany zarówno przez dorosłych, jak i dzieci powyżej 12 roku życia, co sprawia, że jest wygodnym i skutecznym działaniem w walce z objawami grypy i przeziębienia.

### Wskazania

Zwalczanie objawów przeziębienia i grypy, do których należą:

- gorączka,
- ból głowy,
- katar,
- ból mięśni,
- ból gardła.

### Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, udrożniające nos, wspomagające odporność.

### Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka co 4-6 godzin.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 6 saszetek na dobę.

- Lek podaje się doustnie, po rozpuszczeniu zawartości saszetki w szklance gorącej wody.
- Lek można stosować niezależnie od posiłków.
- Leku Gripex Hot nie stosować dłużej niż 3 do 5 dni bez konsultacji lekarskiej.

#### Skład

1 saszetka leku zawiera:

- substancje czynne: paracetamol 650 mg, kwas askorbowy 50 mg, fenylefryny chlorowodorek 10 mg,
- substancje pomocnicze: aspartam (E 951), sacharoza, kwas cytrynowy, sodu cytrynian, aromaty cytrynowe, potasu acesulfam (E 950), żółcień chinolinowa (E 104).

#### Przeciwwskazania

Lek jest przeciwwskazany w przypadku wystąpienia uczulenia na substancje czynne, aminy sympatykomimetyczne lub jakiegokolwiek inny składnik leku. Dodatkowo, nie powinien być stosowany w przypadku niestabilnej choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca, wysokiego ciśnienia tętniczego, wrodzonych niedoborów dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, wirusowego zapalenia wątroby, choroby alkoholowej oraz fenylketonurii. Również nie zaleca się stosowania leku u osób z jaskrą z wąskim kątem przesączania lub anatomicznie wąskim kątem przesączania. Równoczesne stosowanie leku z inhibitorami MAO oraz zydowudyną jest również przeciwwskazane. Ponadto, lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 roku życia.

#### Działania niepożądane

- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka);
- zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego (objawiającego się zaburzeniami świadomości, blednością skóry, spadkiem ciśnienia krwi, poceniem, wytwarzaniem małej ilości moczu, przyspieszonym-oddechem, obrzękami);
- zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej;
- zaburzenia układu krążenia: podwyższenie ciśnienia tętniczego, tachykardia (przyspieszone bicie serca), zaburzenia rytmu serca, bledność skóry;
- zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: zaburzenia oddychania, napad astmy oskrzelowej
- zaburzenia nerek i dróg moczowych: zaburzenia oddawania moczu, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych;

#### Interakcje

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio przez pacjenta oraz o tych, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować Gripex Hot równocześnie z lekami zawierającymi:

- paracetamol,
- fenylefrynę lub pseudoefedrynę,
- inne sympatykomimetyki lub inhibitory MAO,
- zydowudynę.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.