


Gripex Hot Max Lek przeciw objawom przeziębienia i grypy

12 sztuk



Cena: 32,23 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	GRIPEX
Opakowanie	12 saszetek
Postać	Proszek
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Gorączka, Grypa, Przeziębienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Gripex Hot Max lek ten, zawierający paracetamol, fenylefryny chlorowodorek i kwas askorbowy (witaminę C), jest przeznaczony do krótkotrwałego łagodzenia objawów grypy, zakażeń grypopodobnych i przeziębienia u dorosłych oraz dzieci powyżej 12 lat. Paracetamol działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, pomagając w obniżeniu gorączki i redukcji bólu głowy, gardła, mięśni oraz kostno-stawów, które mogą występować podczas przeziębienia lub grypy. Fenylefryna chlorowodorek jest środkiem obkurczającym naczynia krwionośne błony śluzowej nosa, co ułatwia oddychanie przez nos i zmniejsza przekrwienie błony śluzowej. Natomiast kwas askorbowy (witamina C) może wspierać układ odpornościowy organizmu w walce z infekcjami.

Wskazania

Krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych (gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe, bóle kostno-stawowe, obrzęk błony śluzowej nosa).

Działanie

Przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i udrażniające nos.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 saszетка co 4-6 godzin.

Maksymalna dawka dobową wynosi 4 saszetek na dobę.

- Lek podaje się doustnie, po rozpuszczeniu zawartości saszетки w szklance gorącej wody.
- Lek można stosować niezależnie od posiłków.
- Leku Gripex Hot nie stosować dłużej niż 3 do 5 dni bez konsultacji lekarskiej.

Skład

1 saszетка zawiera:

- substancje czynne: paracetamol 1000 mg, kwas askorbowy 100 mg, chlorowodorek fenylefryny 12,2 mg,
- substancje pomocnicze: sacharoza, kwas cytrynowy, sodu cytrynian, potasu acesulfam (E 950), aromat cytrynowy 875060, aromat cytrynowy 87A069, aromat cytrynowy 501.476/AP0504, aromat cytrynowy 875928, aspartam (E 951), żółcień chinolinowa (E 104).

Przeciwwskazania

Lek jest przeciwwskazany w przypadku wystąpienia uczulenia na substancje czynne, aminy sympatykomimetyczne lub jakiegokolwiek inny składnik leku. Dodatkowo, nie powinien być stosowany w przypadku niestabilnej choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca, wysokiego ciśnienia tętniczego, wrodzonych niedoborów dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, wirusowego zapalenia wątroby, choroby alkoholowej oraz fenyloketonurii. Również nie zaleca się stosowania leku u osób z wąską kątem przesączania lub anatomicznie wąskim kątem przesączania. Równoczesne stosowanie leku z inhibitorami MAO oraz zydowudyną jest również przeciwwskazane. Ponadto, lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 roku życia.

Działania niepożądane

- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka);
- zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego (objawiającego się zaburzeniami świadomości, blednością skóry, spadkiem ciśnienia krwi, poceniem, wytwarzaniem małej ilości moczu, przyspieszonym-oddechem, obrzękami);
- zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej;
- zaburzenia układu krążenia: podwyższenie ciśnienia tętniczego, tachykardia (przyspieszone bicie serca), zaburzenia rytmu serca, bledność skóry;
- zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: zaburzenia oddychania, napad astmy oskrzelowej
- zaburzenia nerek i dróg moczowych: zaburzenia oddawania moczu, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych;

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Gripex Hot Max jednocześnie z innymi lekami, które zawierają:

- paracetamol,
- fenylefrynę lub pseudoefedrynę,
- inne sympatykomimetyki lub inhibitory
- zydowudynę.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera sacharozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinni przed zastosowaniem leku skontaktować się z lekarzem. Jedna saszетка zawiera 1,936 g sacharozy, co odpowiada ok. 0,2 wymiennika węglowodanowego.
- Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.