

# Gripex Hot Max Lek przeciw objawom przeziębienia i grypy 8 sztuk



Cena: 29,01 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	GRIPEX
Opakowanie	8 saszetek
Postać	Proszek
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Gorączka, Grypa, Przeziębienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

## Opis produktu

### Opis

**Gripex Hot Max** lek ten, zawierający paracetamol, fenylefryny chlorowodorek i kwas askorbowy (witaminę C), jest przeznaczony do krótkotrwałego łagodzenia objawów grypy, zakażeń grypopodobnych i przeziębienia u dorosłych oraz dzieci powyżej 12 lat. Paracetamol działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, pomagając w obniżeniu gorączki i redukcji bólu głowy, gardła, mięśni oraz kostno-stawów, które mogą występować podczas przeziębienia lub grypy. Fenylefryna chlorowodorek jest środkiem obkurczającym naczynia krwionośne błony śluzowej nosa, co ułatwia oddychanie przez nos i zmniejsza przekrwienie błony śluzowej. Natomiast kwas askorbowy (witamina C) może wspierać układ odpornościowy organizmu w walce z infekcjami.

### Wskazania

Krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych (gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe, bóle kostno-stawowe, obrzęk błony śluzowej nosa).

### Działanie

Przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i udrażniające nos.

### Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka co 4-6 godzin.

Maksymalna dawka dobową wynosi 4 saszetek na dobę.

- Lek podaje się doustnie, po rozpuszczeniu zawartości saszetki w szklance gorącej wody.
- Lek można stosować niezależnie od posiłków.
- Leku Gripex Hot nie stosować dłużej niż 3 do 5 dni bez konsultacji lekarskiej.

## Skład

1 saszетка zawiera:

- substancje czynne: paracetamol 1000 mg, kwas askorbowy 100 mg, chlorowodorek fenylefryny 12,2 mg,
- substancje pomocnicze: sacharoza, kwas cytrynowy, sodu cytrynian, potasu acesulfam (E 950), aromat cytrynowy 875060, aromat cytrynowy 87A069, aromat cytrynowy 501.476/AP0504, aromat cytrynowy 875928, aspartam (E 951), żółcień chinolinowa (E 104).

## Przeciwwskazania

Lek jest przeciwwskazany w przypadku wystąpienia uczulenia na substancje czynne, aminy sympatykomimetyczne lub jakiegokolwiek inny składnik leku. Dodatkowo, nie powinien być stosowany w przypadku niestabilnej choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca, wysokiego ciśnienia tętniczego, wrodzonych niedoborów dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, wirusowego zapalenia wątroby, choroby alkoholowej oraz fenyloketonurii. Również nie zaleca się stosowania leku u osób z wąską kątem przesączania lub anatomicznie wąskim kątem przesączania. Równoczesne stosowanie leku z inhibitorami MAO oraz zydowudyną jest również przeciwwskazane. Ponadto, lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 roku życia.

## Działania niepożądane

- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka);
- zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego (objawiającego się zaburzeniami świadomości, blednością skóry, spadkiem ciśnienia krwi, poceniem, wytwarzaniem małej ilości moczu, przyspieszonym-oddechem, obrzękami);
- zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej;
- zaburzenia układu krążenia: podwyższenie ciśnienia tętniczego, tachykardia (przyspieszone bicie serca), zaburzenia rytmu serca, bledność skóry;
- zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: zaburzenia oddychania, napad astmy oskrzelowej
- zaburzenia nerek i dróg moczowych: zaburzenia oddawania moczu, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych;

## Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Gripex Hot Max jednocześnie z innymi lekami, które zawierają:

- paracetamol,
- fenylefrynę lub pseudoefedrynę,
- inne sympatykomimetyki lub inhibitory
- zydowudynę.

## Ostrzeżenia

- Lek zawiera sacharozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinni przed zastosowaniem leku skontaktować się z lekarzem. Jedna saszетка zawiera 1,936 g sacharozy, co odpowiada ok. 0,2 wymiennika węglowodanowego.
- Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

## Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.