

Gripex Hot Zatoki, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 8 saszetek



Cena: 27,19 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	8 saszetek
Postać	Proszek
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwkaszłowe, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Gripex Hot Zatoki to złożony preparat leczniczy, który przynosi ulgę w przebiegu przeziębień, grypy, infekcji o podobnym charakterze oraz zapalenia zatok przynosowych. Dzięki czterem składnikom aktywnym—paracetamolowi, pseudoefedrynie, dekstrometorfanowi i chlorfeniraminie—wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwkaszłowe. Dodatkowo pomaga udrożnić drogi nosowe i ujścia zatok, zmniejsza obrzęk oraz ilość zalegającej wydzieliny śluzowej.

Wskazania

Gripex Hot Zatoki stosuje się podczas doraźnego leczenia objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych, zapalenia zatok obocznych nosa (gorączka, katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe).

Działanie

Gripex Hot Zatoki zawiera 3 substancje o uzupełniającym się działaniu. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Pseudoefedryna zmniejsza przekrwienie i obrzęk śluzówki przewodów nosowych. Dekstrometorfan działa przeciwkaszłowo, a chlorofenamina łagodzi kichanie.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 1 saszетка, w razie konieczności dawkę można powtarzać lecz nie częściej niż co 4-6 godzin.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: paracetamol (Paracetamolum), pseudoefedryny chlorowodorek (Pseudoephedri hydrochloridum), dekstrometorfanu bromowodorek (Dextromethorpani hydrobromidum), chlorofenaminy maleinian (Chlorphenamini maleas).
- 1 saszетка zawiera: 650 mg paracetamolu, 60 mg pseudoefedryny chlorowodoru, 20 mg dekstrometorfanu bromowodoru

oraz 4 mg chlorofenaminy maleinianu.

- Substancje pomocnicze to: kwas askorbowy, kwas cytrynowy bezwodny, aromat cytrynowy, powidon, sodu cytrynian, skrobia kukurydziana, kwas stearynowy, sacharoza, tytanu dwutlenek, wapnia fosforan, żółcień chinolinowa.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Gripex Hot Zatoki:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek,
- jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość (obniżona liczba czerwonych krwinek),
- jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne leki zawierające paracetamol, dekstrometorfan, pseudoefedrynę lub chlorofenaminę,
- jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki hamujące białko (enzym) zwany monoaminooksydazą (tzw. inhibitory MAO), takie jak np. fenelzyna,

izokarboksazyd, selegilina, moklobemid. Nie należy stosować leku przez okres dwóch tygodni po zaprzestaniu zażywania leków zawierających inhibitory monoaminooksydazy.

- u dzieci do lat 12, bez zalecenia lekarza,
- w ciąży i w okresie karmienia piersią,
- jeśli u pacjenta występuje kaszel z dużą ilością wydzieliny,
- jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa i kaszel związany z astmą oskrzelową,
- jeśli u pacjenta występuje ciężkie nadciśnienie,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba niedokrwienności serca,
- jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza (wrodzona, genetyczna choroba objawiająca się m.in. skłonnością do zapalenia oskrzeli i płuc).

Działania niepożądane

- Rzadko (występuje u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): senność, zawroty głowy, euforia, nadmierne uspokojenie, uczucie pustki w głowie, niepokój, nerwowość, rozdrażnienie, zaburzenia nastroju, pobudzenie psychomotoryczne, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, reakcje alergiczne.
- Bardzo rzadko (występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): agranulocytoza (niedobór krwinek białych), trombocytopenia (niedobór płytek krwi), neutropenia (niedobór krwinek białych).

Ostrzeżenia

- Lek zawiera 15 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

US PHARMACIA
Ziębicka 40
Wrocław