

Gripex Max, tabletki powlekane, 10 tabletek

Cena: 34,14 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwkaszlowe, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Gripex Max to lek w formie tabletek, zawierający trzy aktywne składniki, które skutecznie łagodzą ból, obniżają gorączkę oraz pomagają w zwalczaniu kaszlu i kataru.

Wskazania

Lek Gripex Max wskazany jest do krótkotrwałego leczenia nasilonych objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych takich jak: gorączka, bóle głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, katar, suchy kaszel.

Działanie

Działanie leku Gripex Max wynika z właściwości wchodzących w skład substancji czynnych: paracetamol działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, dekstrometorfan działa przeciwkaszlowo, pseudoefedryna przywraca drożność nosa.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: doustnie 1 do 2 tabletek, 3-4 razy na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są paracetamol (Paracetamolium), pseudoefedryny chlorowodorek (Pseudoephedrini hydrochloridum) i dekstrometorfanu bromowodorek (Dextromethorphan hydrobromidum).
- Każda tabletki powlekana zawiera 500 mg paracetamolu, 30 mg pseudoefedryny chlorowodoru i 15 mg dekstrometorfanu bromowodoru.
- Substancje pomocnicze to: rdzeń tabletki: powidon, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, skrobia żelowana, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna. otoczka: (Opadry Yellow 03B12395): hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), tartrazyna, lak (E 102), makrogol 400 tusz do nadruku: (Opacode Black S-1-17823): szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), alkohol N-butylowy, alkohol izopropylowy, amonu wodorotlenek, glikol propylenowy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Gripex Max: jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, pseudoefedryny chlorowodorek, dekstrometorfanu bromowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające paracetamol; jeśli pacjent stosuje leki z grupy inhibitorów MAO (leki stosowane m.in. w depresji), a także w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich stosowania; jeśli występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej; jeśli występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby; jeśli występuje ciężkie nadciśnienie tętnicze; jeśli występuje choroba niedokrwienna serca; u pacjentów z chorobą alkoholową; u pacjentów z astmą oskrzelową; w okresie ciąży i karmienia piersią; u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

- Niezbyt często (u 1 do 10 /1 000 pacjentów): zmęczenie, zawroty głowy; nudności i wymioty.
- Rzadko (od 1 do 10 /10 000 pacjentów): reakcje nadwrażliwości: obrzęk alergiczny, reakcja anafilaktyczna; skórne reakcje alergiczne, zaczerwienienie skóry, wysypka.
- Bardzo rzadko (u mniej niż 1/10 000 pacjentów): zaburzenia wytwarzania komórek krwi: zmniejszenie liczby granulocytów we krwi, brak granulocytów we krwi, zmniejszenie liczby płytek krwi; napad astmy oskrzelowej; uszkodzenie wątroby występujące najczęściej w wyniku przedawkowania; kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, kamica moczowa; omamy.

Ostrzeżenia

- Gripex Max zawiera tartrazynę, lak (E 102), przez co może powodować reakcje alergiczne.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

US PHARMACIA
Ziębicka 40
Wrocław

Galeria

