

Gripex Max, tabletki powlekane, 20 tabletek

Cena: 56,64 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwkaszlowe, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Gripex Max to wieloskładnikowy lek w formie tabletek, który skutecznie łagodzi typowe symptomy przeziębienia i grypy, takie jak podwyższona temperatura, bóle, zatłaczony nos i kaszel.

Wskazania

Lek Gripex Max stosuje się w krótkotrwałym leczeniu nasilonych objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych takich jak: gorączka, bóle głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, katar, suchy kaszel.

Działanie

Gripex Max działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo (paracetamol), działa przeciwkaszlowo (dekstrometorfan) i przywraca drożność nosa (pseudoefedryna).

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: doustnie 1 do 2 tabletek, 3-4 razy na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są paracetamol (Paracetamolium), pseudoefedryny chlorowodorek (Pseudoephedrinum hydrochloridum) i dekstrometorfanu bromowodorek (Dextromethorphanum hydrobromidum).
- Każda tabletki powlekana zawiera 500 mg paracetamolu, 30 mg pseudoefedryny chlorowodoru i 15 mg dekstrometorfanu bromowodoru.
- Substancje pomocnicze to: rdzeń tabletki: powidon, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, skrobia żelowana, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna. otoczka: (Opadry Yellow 03B12395): hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), tartrazyna, lak (E 102), makrogol 400 tusz do nadruku: (Opacode Black S-1-17823): szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), alkohol N-butylowy, alkohol izopropylowy, amoniak wodorotlenek, glikol propylenowy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Gripex Max:

- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, pseudoefedryny chlorowodorek, dekstrometorfanu bromowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające paracetamol;
- jeśli pacjent stosuje leki z grupy inhibitorów MAO, a także w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich stosowania;
- jeśli występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej;
- jeśli występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby;
- jeśli występuje ciężkie nadciśnienie tętnicze;
- jeśli występuje choroba niedokrwienna serca;
- u pacjentów z chorobą alkoholową;
- u pacjentów z astmą oskrzelową;
- w okresie ciąży i karmienia piersią;
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

- zmęczenie, zawroty głowy;
- nudności i wymioty.

Rzadko (od 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

- reakcje nadwrażliwości: obrzęk alergiczny, reakcja anafilaktyczna;
- skórne reakcje alergiczne, zaczerwienienie skóry, wysypka.

Bardzo rzadko (<1/10 000 pacjentów stosujących lek):

- zaburzenia wytwarzania komórek krwi: zmniejszenie liczby granulocytów we krwi, brak granulocytów we krwi, zmniejszenie liczby płytek krwi;
- napad astmy oskrzelowej;
- uszkodzenie wątroby występujące najczęściej w wyniku przedawkowania;
- kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, kamica moczowa;
- omamy.

Ostrzeżenia

- Gripex Max zawiera tartrazynę, lak (E 102), może powodować reakcje alergiczne.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

US PHARMACIA
Ziębicka 40
Wrocław