

Gripex Noc, tabletki powlekane, 12 tabletek

Cena: 34,64 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	12 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwkaszłowe, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Gripex Noc to lek o wieloskładnikowej formule, który działa kompleksowo, łagodząc ból, obniżając gorączkę i redukując kaszel.

Wskazania

Lek Gripex Noc jest stosowany do łagodzenia objawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych takich jak: gorączka, katar, kichanie, obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, suchy kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

Działanie

Lek Gripex Noc zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, udrażnia przewody nosowe i zmniejsza ilość wydzieliny śluzowej. Działa łagodnie uspokajająco i nasennie, dzięki czemu ułatwia zasypianie.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: doustnie 1 do 2 tabletek, przed snem.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są paracetamol (Paracetamolum), pseudoefedryny chlorowodorek (Pseudoephedrini hydrochloridum), dekstrometorfanu bromowodorek (Dextromethorphanii hydrobromidum) i maleinian chlorfeniraminu (Chlorpheniraminii maleas).
- Substancje pomocnicze to: rdzeń tabletki: skrobia żelowana, powidon, kwas stearynowy, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, błękit brylantowy (E 133), indygotyna, lak (E 132); otoczka: polidekstroza, tytanu dwutlenek (E 171), hypromeloza, błękit brylantowy, lak (E 133), triacetyna, Makrogol 8000, Makrogol 400; tusz do nadruku: Opacode Black S-1-17823 (szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), alkohol n-butyłowy, alkohol izopropylowy, amonu wodorotlenek, glikol propylenowy).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Gripex Noc:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- w przypadku wrodzonego niedoboru dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej;
- u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek;
- w przypadku wirusowego zapalenia wątroby;
- w przypadku ciężkiego nadciśnienia tętniczego;
- w przypadku niestabilnej choroby wieńcowej;
- w przypadku choroby alkoholowej;
- w przypadku stosowania inhibitorów MAO (leki stosowane m.in. w depresji) lub zydowudyny.
- w ciąży i w okresie karmienia piersią,
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Działania niepożądane występujące rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

- Zaburzenia krwi i układu chłonnego: niedokrwistość niehemolityczna (nie związana z rozpadem krwinek czerwonych), zahamowanie funkcji szpiku kostnego, małopłytkowość;
- Zaburzenia serca i (lub) zaburzenia naczyniowe: obrzęki;
- Zaburzenia przewodu pokarmowego: ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, krwotok, bóle brzucha, biegunka, nudności, wymioty, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczką;
- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: świąd, wysypka, pocenie się, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka;
- Zaburzenia nerek i dróg moczowych: nefropatie (choroby nerek) i tubulopatie (choroby powodujące zaburzenie czynności cewek nerkowych);
- Paracetamol to lek powszechnie stosowany, a doniesienia odnośnie działań niepożądanych są rzadkie i zwykle związane z przedawkowaniem. Obserwowano pojedyncze przypadki: ciężkich reakcji skórnych objawiających się powstawaniem zmian rumieniowo-obrzękowych (rumień wielopostaciowy), pęcherzami i martwicą naskórka (zespół Stevensa-Johnsona), a nawet martwicą i złuszczeniem dużych powierzchni naskórka (nekroliza naskórka), obrzęku krtani, wstrząsu anafilaktycznego (ciężka reakcja alergiczna objawiająca się spadkiem ciśnienia krwi, blednością skóry, poceniem, zaburzeniami świadomości, wytwarzaniem małej ilości moczu, przyspieszonym oddechem, obrzękami) i zawrotów głowy.
- Działania powodujące uszkodzenia nerek (nefrotoksyczne) są rzadkie, nie odnotowano ich związku z dawkami terapeutycznymi, poza przypadkami przewlekłego stosowania leku.

Ostrzeżenia

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol, dekstrometorfan, pseudoefedrynę lub chlorfeniraminę;

Producent

US PHARMACIA
Ziębicka 40
Wrocław