

Groprinosin 500 mg Tabletki 20 sztuk

Cena: 27,45 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	GROPRINOSIN
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwwirusowe, Wspomaganie odporności
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 1 roku życia

Opis produktu

Opis

Groprinosin w postaci tabletek to lek, który posiada właściwości przeciwwirusowe i wzmacniające odporność organizmu poprzez pobudzanie czynności układu odpornościowego. Produkt ten jest przeznaczony do użytku zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci powyżej 1 roku życia.

Wskazania

- Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
- W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Działanie

Przeciwwirusowe i immunostylujące.

Dawkowanie

- Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę.
- Dzieci w wieku powyżej 1. roku życia: zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych.

Skład

1 tabletki zawiera:

- substancję czynną leku: inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3),
- pozostałe składniki: skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na inozyliny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz jeśli u pacjenta występuje aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Działania niepożądane

- Bardzo często: zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi lub w moczu.
- Często: przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi, nudności z wymiotami lub bez, ból brzucha, swędzenie skóry, wysypka skórna (jako jedyny objaw), bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie lub złe samopoczucie, bóle stawów.

Ostrzeżenia

- Jeżeli w ciągu 5-14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy zwrócić się do lekarza.
- Groprinosin należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie dną moczanową, zwiększonym stężeniem kwasu moczowego, kamicą moczową oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
- Podczas długotrwałego stosowania (3 miesiące i dłużej) mogą tworzyć się kamienie nerkowe, a takim przypadku lekarz powinien zlecić regularne badania krwi, nerek i wątroby.
- Jeśli zaobserwowano objawy reakcji alergicznej, takiej jak wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka. W takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Chronić od światła i wilgoci.

Producent

GEDEON RICHTER POLSKA
ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki