

Groprinosin Forte, 1000 mg, tabletki, 30 tabletek

Cena: 70,02 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwwirusowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Tabletki Groprinosin Forte to lek o działaniu przeciwwirusowym i stymulującym układ odpornościowy. Ich substancją czynną jest pranobeks inozyny, który w warunkach in vitro hamuje rozmnażanie wirusów chorobotwórczych z grupy Herpes. Groprinosin Forte jest stosowany w przypadkach obniżonej odporności oraz nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, a także u osób z wirusem opryszczki pospolitej, kiedy pojawia się ona na wargach lub skórze. Lek jest przeznaczony dla osób powyżej pierwszego roku życia.

Wskazania

Groprinosin Forte podaje się jako środek wspomagający osoby o obniżonej odporności podczas powracających infekcji górnych dróg oddechowych. Wskazaniem do zastosowania leku jest również leczenie opryszczki pospolitej (Herpes simplex) jeśli wcześniej zdiagnozowaną ją. Produkt do stosowania krótkotrwałego.

Działanie

Groprinosin Forte zawiera pranobeks inozyny o działaniu przeciwwirusowym.

Dawkowanie

Lek stosuje się doustnie, popijając odpowiednią ilością płynu. Zalecane dawkowanie Groprinosinu Forte u dzieci powyżej 1-ego roku życia oraz osób dorosłych to 50 mg leku na kg masy ciała pacjenta. U dorosłych jest to zwykle 1 tabletkę 3 razy dziennie. Maksymalna dawka dobową to 4 tabletki.

Skład

- Substancją czynną leku jest pranobeks inozyny (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3).
- Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Nie stosować Groprinosinu Forte u pacjentów uczulonych na pranobeks inozyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Przeciwwskazaniem do zastosowania Groprinosinu Forte jest również napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Działania niepożądane

Bardzo często występujące (częściej niż u 1 na 10 pacjentów): zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w moczu.

- Często występujące (nie częściej niż u 1 na 10 osób): zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia azotu moczniowego we krwi; nudności z wymiotami lub bez; ból brzucha; swędzenie skóry; wysypka skórna (jako jedyny objaw); bóle głowy; zawroty głowy; zmęczenie lub złe samopoczucie; bóle stawów.
- Niezbyt często występujące (nie częściej niż u 1 na 100 osób): biegunka; zaparcia; nerwowość; senność lub trudności w zasypianiu (bezsenna); zwiększona objętość moczu (wielomocz).
- Częstość nieznana (nie może być określana na podstawie dostępnych danych): Ból w nadbrzuszu, obrzęk twarzy, warg, powiek lub gardła może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), pokrzywka, reakcja alergiczna, nagła reakcja alergiczna dotycząca całego ciała (reakcja anafilaktyczna), wstrząs anafilaktyczny, zawroty głowy, zaczerwienienie skóry (rumień).

Ostrzeżenia

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli: w przeszłości występowały u pacjenta napady dny moczanowej lub zwiększone stężenia kwasu moczowego we krwi oraz moczu; osoba choruje na kamicę nerkową, posiada zaburzenia czynności nerek; zaobserwowano u pacjenta objawy reakcji alergicznej.

Producent

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki