


Grypostop, tabletki powlekane, 12 tabletek

Cena: 12,58 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	12 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	VITAMA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwkaszłowe, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Grypostop to lek wieloskładnikowy, stosowany w doraźnym leczeniu przeziębienia, stanów grypopodobnych oraz grypy. Zawiera trzy substancje czynne: paracetamol, bromowoderek dekstrometorfanu i chlorowoderek pseudoefedryny, które zapewniają działanie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwkaszłowe oraz udrażniają przewody nosowe i zatoki. Grypostop jest odpowiedni dla dzieci powyżej 12. roku życia oraz dorosłych.

Wskazania

Doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych (gorączka, katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe).

Działanie

Grypostop jest produktem leczniczym wieloskładnikowym o kompleksowym działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwkaszłowym. Lek także udrażnia przewody nosowe i ujścia zatok obocznych nosa, ponadto zmniejsza ilość wydzieliny śluzowej oraz przekrwienie i obrzęk śluzówki przewodów nosowych.

Dawkowanie

- Dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli: 2 tabletki w razie konieczności 3 lub 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny.
- Nie przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: paracetamol (Paracetamolum), pseudoefedryny chlorowoderek (Pseudoephedrini hydrochloridum) i dekstrometorfanu bromowoderek (Dextromethorphanii hydrobromidum).
- 1 tabletkę powlekana zawiera: 325 mg paracetamolu, 30 mg pseudoefedryny chlorowodoru i 15 mg dekstrometorfanu bromowodoru.

- Substancje pomocnicze: magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, poliwinylpirolidon (povidon), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia ziemniaczana, hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy, polisorbat 80, tytanu dwutlenek.

Przeciwwskazania

Kiedy nie należy stosować Grypostop:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek,
- jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość (obniżona liczba czerwonych krwinek),
- jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne leki zawierające paracetamol, dekstrometorfan, lub pseudoefedrynę lub inne sympatykomimetyki,
- jeśli pacjent jednocześnie stosuje lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni stosował leki hamujące białko (enzym) zwany monoaminooksydazą (tzw. inhibitory MAO),
- u dzieci do lat 12, w ciąży i w okresie karmienia piersią,
- jeśli u pacjenta występuje kaszel z dużą ilością wydzieliny,
- jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa i kaszel związany z astmą oskrzelową,
- jeśli u pacjenta występuje ciężkie nadciśnienie, ciężka choroba niedokrwienności serca, jeśli u pacjenta choruje na mukowiscydozę.

Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

- senność, zawroty głowy,
- euforia,
- nadmierne uspokojenie, uczucie pustki w głowie,
- niepokój, nerwowość, rozdrażnienie, zaburzenia nastroju, pobudzenie psychomotoryczne,
- nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia,
- reakcje alergiczne.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- agranulocytoza, trombocytopenia, neutropenia.

Częstość nieznana występowania działań niepożądanych (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- nagła gorączka, zaczerwienienie skóry lub liczne niewielkie krostki mogą wystąpić w ciągu pierwszych 2 dni stosowania leku Grypostop.

Ostrzeżenia

- Jeśli wystąpi nadmierna nerwowość, zawroty głowy, bezsenność, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.
- Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
- Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia uszkodzenia wątroby.
- Nie należy stosować innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. leki działające nasennie, uspokajająco).
- Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka z uogólnionym rumieniem skóry i wysypką krostkową, należy przerwać przyjmowanie leku Grypostop i skontaktować się z lekarzem lub niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

Producent

MEDICOFARMA S.A.
Tarnobrzeska 13
Radom