

# Guajazyl 2% syrop 200 ml



Cena: 15,01 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	200 g
Postać	Syrop
Producent	CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA
Przeznaczenie	Kaszel, Kaszel mokry
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 6 lat

## Opis produktu

### Opis

**Guajazyl 25 mg/5 ml, 200 g** to lek wykrztuśny w formie syropu, który stosuje się do leczenia kaszlu. Jego działanie polega na zwiększeniu ilości wydzieliny śluzowej w oskrzelach i tchawicy oraz zmniejszeniu jej lepkości, co pomaga łagodzić kaszel i ułatwiać odkrztuszanie.

### Wskazania

Mokry kaszel, trudności w odkrztuszaniu.

### Działanie

Wykrztuśne, łagodzące kaszel.

### Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml (1 łyżeczka do herbaty, to jest 6,2 g syropu) 3 do 4 razy na dobę.
- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml (1 łyżka stołowa, to jest 18,7 g syropu) 3 do 4 razy na dobę.

### Skład

5 ml syropu zawiera:

- substancję czynną: 125 mg gwajafenezyny,
- substancje pomocnicze: sacharoza, czerwień koszelinowa (E 124), etylu parahydroksybenzoesan, etanol, esencja rumowa spożywcza, powidon, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Nie powinien być stosowany u osób, które mają nadwrażliwość na gwajafenezynę lub inne składniki leku, u dzieci poniżej 6. roku życia, u kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także u pacjentów z niewydolnością wątroby, uszkodzeniami mózgu, padaczką, chorobami

psychicznymi oraz chorobą alkoholową z powodu zawartości etanolu.

#### **Działania niepożądane**

Guajazyl może powodować takie skutki uboczne jak: uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, wymioty, biegunka; zawroty głowy, bóle głowy; wysypka skórna, pokrzywka.

#### **Interakcje**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Guajazyl należy stosować ostrożnie u osób z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą, chorobami naczyń obwodowych, przerostem gruczołu krokowego i jaskrą, przyjmujących fenylpropanoloaminę.

#### **Ostrzeżenia**

- Nie należy stosować leku bez zalecenia lekarza u osób palących tytoń, pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłym zapaleniem oskrzeli lub rozedmą płuc.
- Leku Guajazyl nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, ze względu na zawartość etanolu.

#### **Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.