

Guajazyl syrop 0,125 g/5ml 150 g



Cena: 13,28 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	150 g
Postać	Syrop
Producent	CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA
Przeznaczenie	Kaszel, Kaszel mokry
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Guajazyl 150 g to lek leczniczy przeznaczony do doustnego stosowania, który działa wykrztuśnie. Jego działanie polega na łagodzeniu mokrego kaszlu i ułatwianiu odkrztuszania poprzez zmniejszenie lepkości i zwiększenie objętości wydzieliny śluzowej w oskrzelach oraz tchawicy.

Preparat Guajazyl 150 g jest stosowany w leczeniu kaszlu u dzieci powyżej 6 roku życia oraz u dorosłych

Wskazania

Mokry kaszel, trudności w odkrztuszaniu.

Działanie

Łagodzenie kaszlu i ułatwianie odkrztuszania poprzez zmniejszenie lepkości i zwiększenie objętości wydzieliny śluzowej w oskrzelach i tchawicy.

Dawkowanie

- Dzieci od 6 do 12 lat: 1 łyżeczka do herbaty (5 ml) syropu 3 do 4 razy na dobę.
- Dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli: 1 łyżka stołowa (15 ml) syropu 3 lub 4 razy na dobę.

Skład

5 ml leku Guajazyl zawiera:

- substancję czynną: 125 mg gwajafenezyny.
- substancje pomocnicze: sacharoza, czerwień koszelinowa (E 124), etylu parahydroksybenzoesan, etanol, esencja rumowa spożywcza, powidon, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania



Nie powinien być stosowany u osób, które mają nadwrażliwość na gwajafenezynę lub inne składniki leku, u dzieci poniżej 6. roku życia, u kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także u pacjentów z niewydolnością wątroby, uszkodzeniami mózgu, padaczką, chorobami psychicznymi oraz chorobą alkoholową z powodu zawartości etanolu.

Działania niepożądane

Guajazyl może powodować takie skutki uboczne jak: uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, wymioty, biegunka; zawroty głowy, bóle głowy; wysypka skórna, pokrzywka.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Guajazyl należy stosować ostrożnie u osób z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą, chorobami naczyń obwodowych, przerostem gruczołu krokowego i jaskrą, przyjmujących fenylopropanolaminę.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem stosowania leku Guajazyl należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Należy porozumieć się z lekarzem w przypadku kaszlu uporczywego, utrzymującego się ponad tydzień, powracającego, występującego z gorączką, pojawieniu się wysypki, uporczywego bólu głowy. Kaszel może być objawem ciężkiej choroby.
- Pacjenci palący tytoń, chorujący na astmę oskrzelową, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedmę płuc nie powinny stosować leku bez zalecenia lekarza.
- Lek zawiera barwnik azowy czerwień koszenilową (E 124), może powodować reakcje alergiczne.
- Preparat Guajazyl zawiera etylu parahydroksybenzoesan. Może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.