

Gynoxin, 2%, krem dopochwowy, 30 g

Cena: 44,51 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	30 g
Postać	Krem dopochwowy
Producent	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne, Przeciwgrzybicze
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 16 lat

Opis produktu

Opis

Gynoxin to krem dopochwowy stosowany w leczeniu grzybicy oraz zakażeń mieszanych pochwy i okolic intymnych. Zawiera fentikonazol, pochodną imidazolu, który działa szeroko na grzyby, w tym drożdżaki, oraz na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Gynoxin jest przeznaczony dla osób powyżej 16. roku życia z infekcjami intymnymi.

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania Gynoxinu jest drożdżycza błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy), która może objawiać się silnym i dokuczliwym swędem okolic intymnych, bólem podczas stosunku czy oddawaniu moczu oraz upławami. Krem stosuje się również w infekcjach mieszanych.

Działanie

Gynoxin zawiera przeciwgrzybiczy fentikonazol, będący pochodną imidazolu, który posiada szerokie spektrum działania wobec grzybów, także przeciw drożdżakom.

Dawkowanie

Zwykle stosowane dawkowanie dla pacjentek dorosłych i wieku powyżej 16 lat to 1 aplikacja kremu dopochwowego Gynoxin przed snem przez kolejne 6 dni, lub 2 razy dziennie – wieczorem przed snem a także rano – przez 3 dni.

Skład

- Substancją czynną leku jest azotan fentikonazolu (Fenticonazoli nitras).
- 100 g kremu dopochwowego zawiera 2 g azotanu fentikonazolu.
- Substancje pomocnicze: estry makrogolu z kwasami tłuszczowymi (C12-C18), olej migdałowy pierwszego tłoczenia, glikol propylenowy, alkohol cetylowy, glicerolu monostearynian, lanolina uwodorniona, sodu edetynian, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Gynoxin, jeśli pacjentka ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): odczuwanie pieczenia sromu oraz pochwy, rumień, świąd, wysypka.
- Częstość nieznana: nadwrażliwość w miejscu podania.

Ostrzeżenia

Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:

- pacjentka jest w wieku powyżej 60 lat,
- zakażenie pojawiło się po raz pierwszy lub w ciągu ostatniego roku wystąpiły już 4 drożdżycy,
- stosowane są mechaniczne środki antykoncepcyjne z lateksu – podczas terapii zaleca się inne metody,
- pacjentka albo jej partner kiedykolwiek przechodzili chorobę przenoszoną drogą płciową,
- kobieta jest uczulona na imidazol albo inne przeciwgrzybicze leki dopochwowe,
- u pacjentki wystąpił którykolwiek z objawów: nieprawidłowe lub nieregularne krwawienia, upławy zabarwione krwią, krwawienie z pochwy i (lub) ból w ramionach, rany pochwy i sromu w tym owrzodzenia i pęcherze, ból w dolnej części brzucha, ból pleców oraz ból przy oddawaniu moczu, gorączka ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), cuchnące upławy, nudności, działania niepożądane, takie jak: podrażnienie, zaczerwienienie, obrzęk, świąd, wysypka, które są związane z leczeniem.

Producent

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA

Galeria

