

Gynoxin Optima 200mg, 3 tabletki dopochwowe Inpharm

Cena: 29,09 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	3 kapsułki
Postać	Kapsułki dopochwowe
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne, Przeciwgrzybicze
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Gynoxin Optima to lek stosowany w infekcjach intymnych, w grzybiczych i mieszanych zakażeniach. Produkt jest dostępny w formie kapsułek dopochwowych, zawierających fentikonazol, który działa szeroko przeciwko drożdżycy miejsc intymnych oraz mieszanym infekcjom pochwy. Lek hamuje rozwój bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Gynoxin Optima jest przeznaczony dla kobiet powyżej 16. roku życia.

Wskazania

Lek Gynoxin Optima stosuje się w drożdżycy błon śluzowych narządów płciowych, jak: grzybicze zapalenie pochwy, grzybicze zapalenie sromu, upławy. Wskazaniem do zastosowania kapsułek dopochwowych jest także leczenie mieszanych zakażeń pochwy. Tego typu infekcje intymne mogą objawiać się silnym swądem okolic intymnych czy bólem w czasie stosunku albo oddawania moczu.

Działanie

Gynoxin Optima zawiera substancję czynną fentikonazol, który wykazuje działanie przeciwgrzybicze oraz jest aktywny wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.

Dawkowanie

Zwykle stosowana dawka leku Gynoxin Optima to 1 kapsułka dopochwowa stosowana raz na dobę przez trzy kolejne dni. Aplikować głęboko do pochwy wieczorem przed snem.

Skład

Substancją czynną leku jest azotan fentikonazolu (Fenticonazoli nitras).

Substancje pomocnicze: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), etylu parahydroksybenzoesan (E 215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E 217).

Przeciwwskazania

Leku Gynoxin Optima nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników.



Działania niepożądane

Bardzo rzadko występujące objawy niepożądane (rzadziej niż u 1 osoby na 10 000): uczucie pieczenia sromu i pochwy, wysypka rumieniowa.

Ostrzeżenia

Stosowanie leku należy omówić z lekarzem jeśli u pacjentki wystąpił którykolwiek z poniższych objawów:

- nieprawidłowe lub nieregularne krwawienia,
- upławy zabarwione krwią,
- rany pochwy i sromu w tym owrzodzenia i pęcherze,
- ból w dolnej części brzucha oraz ból przy oddawaniu moczu,
- działania niepożądane takie jak podrażnienie, zaczerwienienie, obrzęk, które są związane z leczeniem.

Producent

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA