

Gynoxin UNO 600 mg, 1 kapsułka dopochwowa

Cena: 27,71 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	1 kapsułka
Postać	Kapsułka dopochwowa miękka
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Antybakteryjne, Przeciwgrzybicze
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Gynoxin Uno to lek w formie kapsułki dopochwowej stosowany na mieszane i grzybicze zakażenia pochwy. Zawiera fentikonazol, który działa przeciw grzybom, drożdżakom oraz niektórym bakteriom odpowiedzialnym za infekcje intymne. Stosowany jest w leczeniu drożdżycy narządów płciowych, w tym grzybicy pochwy, oraz zakażeń mieszanych. Terapia polega na jednorazowym zastosowaniu kapsułki dopochwowej. Lek przeznaczony jest dla kobiet powyżej 16. roku życia.

Wskazania

- Wskazaniem do zastosowania Gynoxin Uno jest drożdżycza błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy).
- Infekcji intymnej mogą towarzyszyć takie objawy jak: dokuczliwy świąd okolic intymnych albo ból podczas oddawania moczu i stosunku.
- Gynoxin Uno można stosować również w infekcji mieszanej.

Dawkowanie

- Pacjentki w wieku powyżej 60 lat, przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.
- Lek stosuje się dopochwowo. Kapsułek dopochwowych nie można przyjmować doustnie. Gynoxin Uno należy umieścić głęboko w pochwie. Jeśli po 7 dniach pacjentka czuje się gorzej albo objawy nie ustępują, to należy skonsultować się z lekarzem.
- Zwykle stosowane dawkowanie u kobiet dorosłych i w wieku powyżej 16 lat to 1 kapsułka dopochwowa wieczorem przed snem. W przypadku, gdy objawy utrzymują się po 1 aplikacji to po 3 dniach można zastosować kolejną kapsułkę dopochwową.

Skład

- Substancją czynną leku jest azotan fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 600 mg azotanu fentikonazolu.
- Substancje pomocnicze: parafina ciekła, wazelina biała, lecytyna sojowa, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), etylu parahydroksybenzoesan (E 215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E 217).

Działania niepożądane

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): odczuwanie pieczenia sromu oraz pochwy, rumień, świąd, wysypka.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli: pacjentka jest w wieku powyżej 60 lat, zakażenie pojawiło się po raz pierwszy lub w ciągu ostatniego roku wystąpiły już 4 drożdżyce, stosowane są mechaniczne środki antykoncepcyjne z lateksu – podczas terapii zaleca się inne metody, pacjentka albo jej partner kiedykolwiek przechodzili chorobę przenoszoną drogą płciową, kobieta jest uczulona na imidazol albo inne przeciwgrzybicze leki dopochwowe, u pacjentki wystąpił którykolwiek z objawów: nieprawidłowe lub nieregularne krwawienia, upławy zabarwione krwią, krwawienie z pochwy i (lub) ból w ramionach, rany pochwy i sromu w tym owrzodzenia i pęcherze, ból w dolnej części brzucha, ból pleców oraz ból przy oddawaniu moczu, gorączka ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), cuchnące upławy, nudności, działania niepożądane, takie jak: podrażnienie, zaczerwienienie, obrzęk, świąd, wysypka, które są związane z leczeniem.
- Jeśli kapsułka dopochwowa zostanie połknięta należy natychmiast skontaktować się z lekarzem albo udać się do najbliższego szpitala.
- Jeśli partner także został zakażony, to on również powinien poddać się terapii.
- Gynoxin Uno zawiera etylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan sodowy, które mogą powodować reakcje alergiczne, także późnego typu. Jeśli pojawi się miejscowe podrażnienie albo reakcji alergicznej to należy przerwać stosowanie leku.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C .
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

InPharm Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 249
04-458 Warszawa