

Gynoxin Uno, 600 mg, kapsułki dopochwowe, miękkie, 1 kapsułka

Cena: 23,58 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	1 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne, Przeciwgrzybicze
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Gynoxin Uno to preparat w postaci kapsułki dopochwowej, stosowany w leczeniu infekcji pochwy o podłożu grzybiczym oraz mieszanym. Substancją czynną leku jest fentikonazol, który wykazuje szerokie działanie przeciwgrzybicze – skuteczny jest zarówno wobec drożdżaków, jak i niektórych bakterii odpowiedzialnych za zakażenia intymne. Gynoxin Uno zalecany jest przy grzybicy narządów płciowych, w tym przy drożdżycy pochwy, a także w przypadku infekcji o mieszanym charakterze. Leczenie polega na jednorazowym zastosowaniu jednej kapsułki dopochwowo. Lek przeznaczony jest dla kobiet powyżej 16. roku życia.

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania Gynoxin Uno jest drożdżycza błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy). Infekcji intymnej mogą towarzyszyć takie objawy jak: dokuczliwy świąd okolic intymnych albo ból podczas oddawania moczu i stosunku. Gynoxin Uno można stosować również w infekcji mieszanej.

Działanie

Gynoxin Uno zawiera fentikonazol, będący pochodną imidazolu, który posiada szerokie spektrum działania wobec grzybów, także przeciw drożdżakom. Substancja ta jest aktywna również wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Globulki dopochwowe usuwają także objawy infekcji intymnej.

Dawkowanie

Zwykle stosowane dawkowanie u kobiet dorosłych i w wieku powyżej 16 lat to 1 kapsułka dopochwowa wieczorem przed snem. W przypadku, gdy objawy utrzymują się po 1 aplikacji to po 3 dniach można zastosować kolejną kapsułkę dopochwową.

Skład

- Substancją czynną leku jest azotan fentikonazolu (Fenticonazoli nitras).
- 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 600 mg azotanu fentikonazolu.



- Substancje pomocnicze: parafina ciekła, wazelina biała, lecytyna sojowa, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), etylu parahydroksybenzoesan (E 215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E 217).

Przeciwwskazania

Leku nie należy stosować u pacjentek uczulonych na substancję czynną lub inny z pozostałych składników.

Ostrzeżenia

Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:

- pacjentka jest w wieku powyżej 60 lat,
- zakażenie pojawiło się po raz pierwszy lub w ciągu ostatniego roku wystąpiły już 4 drożdżycy,
- stosowane są mechaniczne środki antykoncepcyjne z lateksu – podczas terapii zaleca się inne metody,
- pacjentka albo jej partner kiedykolwiek przechodzili chorobę przenoszoną drogą płciową,
- kobieta jest uczulona na imidazol albo inne przeciwgrzybicze leki dopochwowe,
- u pacjentki wystąpił którykolwiek z objawów: nieprawidłowe lub nieregularne krwawienia, upławy zabarwione krwią, krwawienie z pochwy i (lub) ból w ramionach, rany pochwy i sromu w tym owrzodzenia i pęcherze, ból w dolnej części brzucha, ból pleców oraz ból przy oddawaniu moczu, gorączka ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), cuchnące upławy, nudności, działania niepożądane, takie jak: podrażnienie, zaczerwienienie, obrzęk, świąd, wysypka, które są związane z leczeniem.

Producent

CATALENT ITALY