


Hascosept, 1,5 mg/g, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 100 g



Cena: 23,68 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HASCOSEPT
Opakowanie	100 g
Postać	Płyn
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Hascosept to roztwór do płukania jamy ustnej, który łagodzi ból gardła. Działa miejscowo znieczulająco i odkażająco. Jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.

Wskazania

Lek Hascosept stosuje się w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii.

Działanie

Lek Hascosept zawiera substancję czynną chlorowodrek benzydamin. Jest to substancja o działaniu przeciwpalnym i przeciwbólowym. Stosowana miejscowo działa znieczulająco i odkażająco.

Dawkowanie

Produkt leczniczy do stosowania w jamie ustnej. Dawkowanie Hascoseptu polega na płukaniu 2 do 3 razy na dobę jamy ustnej i gardła 15 ml (1 łyżka) nierozcieńczonego roztworu lub rozcieńczonego niewielką ilością wody.

Skład

- Substancją czynną leku jest benzydamin chlorowodrek.
- 100 g roztworu zawiera 0,15 g benzydamin chlorowodorku.
- Substancje pomocnicze: błękit patentowy, żółcień chinolinowa, aromat miętowy, glicerol, etanol 96%, sacharyna, sodu wodorowęglan, metylu parahydroksybenzoesan, polisorbit 20, woda oczyszczona.



Przeciwwskazania

Nie stosować leku Hascosept w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Działania niepożądane

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów stosujących lek; częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty, zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, zaburzenia układu nerwowego: zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka.

Ostrzeżenia

- Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
- Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po pierwszym otwarciu produkt leczniczy można stosować przez 12 miesięcy.
- Chronić od światła i wilgoci.

Producent

HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław