

Hascosept Forte 3 mg/ml, roztwór do stosowania w jamie ustnej, aerozol, 30 ml



Cena: 36,77 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HASCOSEPT
Opakowanie	30 ml (but.)
Postać	Aerozol
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Dezynfekujące (odkażające), Przeciwbólowe, Przeciwobrzękowe, Przeciwzapalne, Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Aerozol Hascosept Forte to lek w formie roztworu do stosowania w jamie ustnej, zawierający podwójną dawkę substancji czynnej – benzydaminę*. Jest przeznaczony do leczenia objawów związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła, takich jak ból, zaczerwienienie, obrzęk oraz afty.

Hascosept w aerozolu może być stosowany przy infekcjach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu krtani, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, a także po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii oraz po intubacji.

Wskazania

Leczenie objawów takich jak ból, zaczerwienienie, obrzęk i afty - związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła:

- w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych,
- w zapaleniu krtani,
- w zapaleniu błon śluzowych po radioterapii,
- w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii, a także po intubacji.

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe, miejscowe znieczulające i odkażające.

Dawkowanie

Dorośli: stosować 2 do 6 razy na dobę, po 2-4 dawki (jedna dawka zawiera 0,14 ml roztworu).



Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancję czynną: benzydaminę chlorowodorek 3 mg,
- substancje pomocnicze: aromat miętowy (AR 0960), glicerol (E 422), etanol 96%, sacharyna sodowa (E 954), makroglicerolu rycynooleinian, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.
- Nie stosować u dzieci.

Działania niepożądane

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko :

- uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej,
- suchość w jamie ustnej,
- nudności oraz wymioty,
- reakcje nadwrażliwości,
- reakcja alergiczna (nadwrażliwość),
- zaburzenia czucia, drętwienie,
- zawroty głowy, bóle głowy,
- wysypka.

Ostrzeżenia

- Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, leków o działaniu miejscowym, może spowodować reakcję alergiczną.
- W takim przypadku lek należy odstawić i zgłosić się do lekarza, który zaleci odpowiednie postępowanie

Producent

HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław