

Hascosept smak cytrynowo-miodowy, 3 mg, pastylki twarde, 24 pastylki

Cena: 24,70 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HASCOSEPT
Opakowanie	24 pastylki
Postać	Pastylki twarde
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	odkażające, Przeciwpalne, Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Hascosept to twarde pastylki do ssania o smaku cytrynowo-miodowym, stosowane w łagodzeniu objawów zapalenia gardła i jamy ustnej, takich jak zaczerwienienie i ból. Zawierają benzydaminę, która działa przeciwpalnie, miejscowo znieczulająco oraz odkażająco. Lek jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia

Wskazania

Pastylki Hascosept smak cytrynowo-miodowy podaje się miejscowo w leczeniu objawów stanu zapalnego gardła i jamy ustnej, np. obrzęk, zaczerwienienie lub ból.

Działanie

Hascosept smak cytrynowo-miodowy zmniejsza stan zapalny i miejscowo znieczula oraz odkaża. Lek zawiera benzydaminę z grupy indolowych leków przeciwpalnych (NLPZ) stosowanych miejscowo i ogólnie.

Dawkowanie

Lek należy stosować doustnie, pastylki należy powoli ssać, nie żuć ani połykać. Dawkowanie Hascoseptu smak cytrynowo-miodowy u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat to 1 pastylka 3 razy dziennie. Nie stosować dłużej niż 7 dni.

Skład

- Substancją czynną leku jest benzydaminii chlorowodorek (Benzydaminii hydrochloridum).
- 1 pastylka twarda zawiera 3 mg chlorowodoru benzydaminii.
- Substancje pomocnicze: izomalt (E 953), acesulfam potasowy (E 950), kwas cytrynowy jednowodny, lewomentol, aromat



cytrynowy, aromat miodowy, żółcień chinolinowa (E 104).

Przeciwwskazania

Nie stosować leku u osób z nadwrażliwością na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników.

Działania niepożądane

- Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób): reakcje skórne jako nadwrażliwość na światło.
- Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): pieczenie lub suchość w jamie ustnej. W razie wystąpienia tych objawów, można je zmniejszyć wypijając szklankę wody powoli, małymi łykami.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): skurcz oskrzeli.
- Częstość nieznana: przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego u płodu, reakcja alergiczna (nadwrażliwość), ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny) z objawami takimi jak: trudności w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia, silny świąd skóry lub wystające guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła; reakcja taka może zagrażać życiu, niedoczulica jamy ustnej (miejscowa utrata wrażliwości błony śluzowej jamy ustnej).

Ostrzeżenia

- Nie zaleca się stosowania leku, jeśli u pacjenta występuje uczulenie na kwas acetylosalicylowy (aspirynę) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
- Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występowała astma oskrzelowa, gdyż może on spowodować duszność.
- U niektórych pacjentów owrzodzenie jamy ustnej i gardła może być jedynie objawem innego ciężkiego procesu chorobowego. W przypadku gdyby objawy nasilały się lub nie ustępowały po 3 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.
- Hascosept smak cytrynowo-miodowy zawiera izomalt, dlatego w przypadku osób z nietolerancją niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Przechowywać w blistrze w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
ul. Żmigrodzka 242e
51-131 Wrocław