

Hascovir control MAX 400 mg, 60 tabletek

Cena: 89,68 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwwirusowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Hascovir Control Max 400 mg to lek w formie białych, niepowlekanych tabletek, zawierający acyklowir jako substancję czynną. Acyklowir działa, hamując namnażanie wirusów z grupy Herpes. Hascovir Control Max jest przeznaczony do stosowania przez dorosłych w celu zapobiegania nawrotom opryszczki pospolitej. Lek ten może być stosowany wyłącznie przez osoby, u których wcześniej stwierdzono zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

Wskazania

Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej u dorosłych.

Działanie

Przeciwwirusowe.

Dawkowanie

Dorośli: doustnie 1 tabletka dwa razy na dobę, co 12 godzin.

Skład

1 tabletka zawiera:

- substancję czynną: acyklowir 400 mg,
- substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokryształiczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

- Leku nie powinien być przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.
- Jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Nie należy stosować leku przez osoby z obniżoną odpornością (np. po przeszczepie szpiku kostnego, zakażone wirusem HIV)

Działania niepożądane

Często:

- bóle i zawroty głowy,
- nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha,
- świąd, wysypka (pojawiająca się również po narażeniu na działanie światła słonecznego),
- zmęczenie, gorączka.

Niezbyt często:

- reakcje skórne: pokrzywka, wypadanie włosów.

Rzadko:

- zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych we krwi.

Bardzo rzadko:

- niedokrwistość, zmniejszenie liczby krwinek białych, małopłytkowość (niedobór płytek krwi),
- pobudzenie, stan dezorientacji, drżenia, niezdolność do ruchów, zaburzenia mowy, omamy, objawy psychiatryczne, drgawki, senność, encefalopatia (uszkodzenie mózgu), śpiączka,
- zapalenie wątroby, żółtaczkę,
- ostra niewydolność nerek.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku osób z: zaburzeniami czynności nerek lub stosujących leki mogące uszkadzać nerki, szczególnie ciężką nawrotową opryszczką wargową, częstymi (więcej niż 6 razy w roku) i długotrwałymi (powyżej 5 dni nieskutecznego leczenia) nawrotami opryszczki. Konsultację zaleca się również osobom w podeszłym wieku.
- Pacjenci z niewydolnością nerek lub odwodnieni powinni przyjmować odpowiednią ilość płynów.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

"Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek" S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E
51-131 Wrocław

Galeria

