

Hedelix 40 mg/5 ml, syrop, 100 ml



Cena: 26,32 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HEDELIX
Opakowanie	100 ml
Postać	Syrop
Producent	FORTIS PHARMACEUTICALS SP. Z O.O. SP. K.
Przeznaczenie	Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Hedelix Syrop to lek o działaniu wykrztuśnym, szczególnie przydatny w stanach zapalnych dróg oddechowych. Zawiera gęsty ekstrakt z liści bluszczu pospolitego (*Hederae helicis folii extractum spissum*).

Wskazania

Stany zapalne dróg oddechowych, objawowe leczenie przewlekłych stanów zapalnych oskrzeli.

Działanie

Wykrztuśne.

Dawkowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy przyjmować w następujący sposób: dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież: 5ml (jedna łyżeczka) 3 razy na dobę; dzieci w wieku od 6. do 11. lat: 2,5ml (1/2 łyżeczki) 4 razy na dobę; u dzieci w wieku 2 do 5. roku życia: 2,5ml 3 razy na dobę. Syrop Hedelix należy przyjmować w stanie nierozcieńczonym. Zaleca się popicie syropu znaczną ilością płynu (zaleca się szklankę wody).

Skład

100ml syropu zawiera: 0,8g wyciągu liści z bluszczu pospolitego (*hederae helicis spissum*) DER (2,2 – 2,9:1); ekstrahent etanol 96% (V/V); glikol propylenowy: woda (45:2:53) m/m/m oraz pozostałe składniki: makroglicerolu hydroksystearynian, olejek anyżowy, hydroksyetyloceluloza, sorbitol (70% roztwór), glikol propylenowy, glicerol, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Zaburzenia syntezy bursztynianu argininy. Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia.



Ostrzeżenia

Utrzymujący się kaszel lub nawracający u dzieci w wieku od 2 do 4 lat wymaga zdiagnozowania przed zastosowaniem leku. Jeśli pojawi się duszność i gorączka lub ropna plwocina należy skonsultować się z lekarzem, lub farmaceutą. Jednoczesne stosowanie z opiatowymi środkami przeciwkaszlowymi, takimi jak kodeina lub dekstrometorfan nie jest zalecane bez kontroli lekarza. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z nieżytem żołądka lub wrzodem żołądka. Ze względu na zawartość wyciągu roślinnego, syrop Hedelix może tworzyć zmętnienie roztworu, a smak może ulec niewielkim zmianom. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych lekach, a także o lekach, które planuje pacjent przyjmować. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i laktacji. Z powodu braku wystarczających danych stosowanie w okresie ciąży i laktacji nie jest zalecane. Lek w 5ml zawiera 1,75g sorbitolu (co odpowiada 0,44g fruktozy) i stanowi około 0,15 jednostek węglowodanowych. Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku lub podaniem go dziecku

Producent

Fortis Pharmaceuticals Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice