

Helicid MAX (Piastrazol), 20 mg, kapsułki dojelitowe twarde, 14 kapsułek

Cena: 19,20 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	14 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	ZENTIVA K.S.
Przeznaczenie	Nadkwaśność, Refluks, Zgaga
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Helicid MAX to lek w postaci kapsułek dojelitowych, który zmniejsza ilość wydzielanego kwasu solnego w żołądku. Stosowany jest w krótkoterminowym leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego u dorosłych, takich jak zgaga i kwaśne odbijanie.

Wskazania

Helicid MAX w kapsułkach dojelitowych jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych.

Działanie

Helicid MAX, to produkt leczniczy zawierający omeprazol, który należy do inhibitorów pompy protonowej. Omeprazol zmniejsza ilość wydzielanego kwasu solnego w żołądku.

Dawkowanie

Dorośli: zalecana dawka wynosi 1 kapsułka rano, raz na dobę przez 14 dni.

Skład

- Substancją czynną leku jest omeprazol.
- 1 kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu (Omeprazolum).
- Substancje pomocnicze: wypełnienie kapsułki - sacharoza, ziarenka (zawierające skrobię kukurydzianą i sacharozę); sodu laurylosiarczan, disodu fosforan bezwodny, mannitol, hypromeloza, makrogol 6000, talk, polisorbát 80, tytanu dwutlenek (E171) i kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%. ; otoczka kapsułki: żelatyna, żółcień chinolinowa (E104) i tytanu dwutlenek (E171).

Przeciwwskazania

Nie należy stosować Helicid MAX w przypadku nadwrażliwości na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz jeśli pacjent jest uczulony na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol) lub jeżeli przyjmuje lek zawierający atazanawir lub nelfinawir (leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób na 100): ból głowy, ból brzucha, biegunka, zaparcia, wzdęcia; nudności lub wymioty.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób na 1000): obrzmienie stóp i kostek; zawroty głowy, uczucie mrowienia i kłucia, senność; zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby; wysypka skórna, pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze) oraz świąd skóry; ogólne złe samopoczucie oraz brak energii.
- Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób na 10 000): agranulocytoza, małopłytkowość, hiponatremia (może to prowadzić do osłabienia, wymiotów i kurczów mięśniowych); uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia; reakcje alergiczne, zmiana odczuwania smaku; niewyraźne widzenie; nagłe uczucie świstów oddechowych lub zadyszki (skurcz oskrzeli); suchość w jamie ustnej; zapalenie błony śluzowej jamy ustnej; grzybica przewodu pokarmowego; mikroskopowe zapalenie jelita grubego; zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez; wypadanie włosów (łysienie); wysypka skórna spowodowana nadwrażliwością skóry na światło (należy unikać przebywania w słońcu); bóle stawów, bóle mięśni; zaburzenia czynności nerek (śródmiażdżowe zapalenie nerek); nadmierne pocenie się.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 osoby na 10 000): agresja; omamy (spospoznanie nieistniejących przedmiotów, osób); ciężkie zaburzenia czynności wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu; zespół Stevensa-Johnsona, toksyczno-rozplywna martwica naskórka; osłabienie mięśni; powiększenie piersi u mężczyzn.
- Częstość nieznana działań niepożądanych: po stosowaniu leku przez ponad 3 miesiące może wystąpić zmniejszenie stężenia magnezu we krwi; wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów.

Ostrzeżenia

- Jeśli u pacjenta występowała kiedykolwiek wcześniej skórna reakcja po zastosowaniu leku zmniejszającego wydzielanie kwasu żołądkowego lub wystąpiła wysypka skórna, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych przed zastosowaniem Helicid MAX należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek może zatajać objawy innych chorób, więc w przypadku wystąpienia niepokojących objawów ze strony przewodu pokarmowego należy bezzwłocznie zasięgnąć opinii lekarza.
- Leku Helicid MAX nie stosować zapobiegawczo.
- Lek zawiera sacharozę i żółcień chinolinową. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera żółcień chinolinową, która może powodować reakcje alergiczne.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C.

Producent

Zentiva, k.s.
U Kabelovny 130
102 37 Prague 10 (Republika Czeska)